


COLDREX* HOTREM BLACKCURRANT Powders
КОЛДРЕКС* ХОТРЕМ КАСИС Прах за перорален разтвор



Моля преди употреба, прочетете внимателно тази листовка.

Състав: Всяко саше съдържа като активни вещества:

Paracetamol	750 mg.
Phenylephrine hydrochloride	10 mg.
Ascorbic acid	60 mg.

Също така съдържа като помощни вещества: захар, лимонена киселина, натриев захарин, натриев цитрат, оцветител и есенции.

Опаковката съдържа 5 или 10 сашета, като всяко от тях съдържа 5 гр. прах.

Показания: Coldrex HotRem Blackcurrant краткотрайно облекчава симптомите при грип, настинка и висока температура. Тези симптоми главоболие, болка при възпалено гърло, мускулни болки, запушен нос, синусити и свързаната с тях болка.

Характеристики: Coldrex HotRem Blackcurrant съдържа парацетамол - аналгетик (болкоуспокояващо средство) и антипиретик (понижава температурата), фенилефрин хидрохлорид - деконгестант, който предизвиква отбъбване на лигавицата на носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-леко, и витамин С, който обикновено се прилага при грип и настинки поради повишените нужди на организма, особено в началния стадий на заболяването.

Противопоказания: **Не приемайте други лекарства, съдържащи парацетамол.**

Не взимайте Coldrex HotRem Blackcurrant, ако сте алергични към парацетамол, фенилефрин хидрохлорид, витамин С или някое от помощните вещества; ако имате чернодробни или остри бъбречни заболявания; ако страдате от повишена функция на тироидната жлеза, диабет или сте лекувани от високо кръвно налягане или сърдечни заболявания; или ако взимате трициклични антидепресанти, бета-блокери и приемате или сте приемали, през последните две седмици, инхибитори на моноаминооксидазата.

Предупреждения / предпазни мерки: Преди да вземете Coldrex HotRem Blackcurrant се консултирайте с Вашия лекар, ако взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин. Ако сте бременна или кърмите, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Coldrex HotRem Blackcurrant.

Лекарственият продукт съдържа 2,895 гр. захар. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя до 2,895 гр. захар. По тази



причина е неподходящ за лица с вродена непоносимост към фруктоза, глюкозен / галактозен синдром на малабсорбция или захарно / изомалтозен дефицит.

Дозировка: Изсипете едно саше в чаша и напълнете с гореща вода.
Разбъркайте докато се разтвори.

Възрастни и деца на и над 12 години: Да се взима по едно саше на всеки 4 часа.

Не взимайте повече от 4 сашета за период от 24 часа.

Да не се взима на интервали по-кратки от 4 часа.

Да не се дава на деца под 12 години, освен по лекарско предписание.

Консултирайте се с лекар, ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни.

Не надвишавайте посочената доза. Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако приемете повече от посочената доза, незабавно потърсете медицинска помощ, дори и да се чувствате добре.

Нежелани реакции: При парацетамол, нежелани реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Фенилефрин може да причини гадене, главоболие, леко повишаване на кръвното налягане и много рядко сърцебиене. Тези ефекти са преходни. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

Срок на годност: Не използвайте след датата посочена на опаковката.
Срок на годност - 3 години.

Да се пази на места, недостъпни за деца.
Да се съхранява при температура под 25°C.

Притежател на разрешението за употреба:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, UK

Производител на лекарственият продукт:
SmithKlineBeecham S.A., Ctra. De Ajalvir, Km 2,5,
Alcala de Henares, 28806, Madrid, Spain

Coldrex* е търговска марка.
GSK (logo)

