

Информация за пациента.

Моля прочетете внимателно!

**БЕТАХА 20
БЕТАКСА 20**

Състав

Лекарствено вещество: Betaxolol hydrochloride 20 mg в една филмирана таблетка.

Помощни вещества: микрокристална целулоза, колоиден силициев диоксид безводен, магнезиев стеарат, кроскармелоза натриева сол.

Обвивка: Album Sepifilm 752, Aurantiacum Sepifilm 3084.

Лекарствена форма и опаковка

Филмирани таблетки.

Съдържание на 1 опаковка:

30, 60 или 100 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

ЗЕНТИВА АД

Хлоховец, Словацка Република

Фармакотерапевтична група

Антихипертензивно средство, кардиоагент.

Действие

Бетакса съдържа лекарствено вещество, което понижава кръвното налягане, забавя сърдечния ритъм и намалява кислорода, необходим на сърцето.

Показания

Лечение на високо кръвно налягане (хипертония).

Ангина пекторис (нарушения, в резултат на недостатъчно кръвоснабдяване на сърдечния мускул и вторична превенция след инфаркт на миокарда).

Противопоказания

Лекарственият продукт не трябва да бъде използван при доказана свръхчувствителност (алергия) към betaxolol или към някое от помощните вещества.

Лекарственият продукт не трябва да се прилага при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, в кардиогенетичен шок и с много ниско кръвно налягане, Prinzmetal's



ангина (като монотерапия), при нарушена импулсна проводимост на сърцето (пациенти с втора или трета степен атриовентрикуларен блок без пейсмейкър) и при много забавен сърдечен ритъм. При леко нарушение на проводимостта (първа степен на атриовентрикуларен блок) beta₁ се използва само ако несъмнено е необходимо.

При пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (ХОББ) могат да се появят затруднения в дишането. Трябва да има сериозни, добре обосновани причини, за да се използва Бетакса при тези пациенти. Препоръчва се лечението да започне с начални дози от 10 mg дневно (т.е. половината от обичайната доза).

Бетакса е противопоказан за пациенти с бронхиална астма.

При пристъп от спазъм на долните дихателни пътища бета миметичните бронходилататори могат да бъдат полезни, тъй като Бетакса не влияе на тяхната активност.

Бетакса може да бъде прилаган при пациенти с тежко нарушение в кръвоснабдяването на долните крайници само след обсъждане на комплексните причини.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Никога не прекъсвайте лечението внезапно. Ако е необходимо прекъсване на терапията с Бетакса, дозировката трябва да бъде намалена постепенно.

Няма достатъчен клиничният опит за дълготрайна употреба на Бетакса при деца.

Този лекарствен продукт съдържа лекарствено вещество, което може да даде положителни резултати при антидопингови тестове на спортисти.

При пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (ХОББ) се препоръчва изследване на функцията на белите дробове преди започване на лечение с Бетакса. С Бетакса обаче, рискът от нежелани лекарствени реакции е малък.


Контролирането на хипертония, причинена от феохромоцитом (заболяване на надбъбречната медула), изисква специални мерки.

Необходимо е внимание при диабетици, предразположени към хипогликемия (ниско ниво на кръвна захар).

Ако е необходима десенсибилизираща терапия при алергични пациенти, Бетакса трябва да бъде сменен с антихипертензивен лекарствен продукт от друг клас (не бета-блокери).

Лекарствени взаимодействия

Действието на Бетакса и на други лекарствени продукти, приемани едновременно, може взаимно да се повлияе. Затова е необходимо да информирате Вашия лекар за всички лекарствени продукти, които приемате в момента или ще започнете да приемате, независимо дали са по лекарско предписание или са свободно продавани.



Не се препоръчва едновременната употреба на Бетакса с инхибитори на моноамин оксидазата (МАО инхибитори, лекарствени продукти, които облекчават депресия), с лекарствени продукти, използвани да коригират нарушения на сърдечния ритъм (амиодарон) и с такива, които понижават кръвното налягане (антихипертензивни средства).

При едновременна употреба с антидиабетични лекарствени продукти е възможно взаимно усилване на тяхното действие. Възможно е клиничните белези на хипогликемията (такива като ускорен сърдечен ритъм и тремор) да бъдат маскирани от действието на Бетакса.

Обща анестезия: Преди операция анестезиологът трябва да бъде информиран, че пациентът е на лечение с betaxolol. Не се препоръчва прекъсване на терапията, тъй като съществува риск, свързан с внезапното спиране на лечението с бета-блокери.

Бременност и кърмене

Информирайте своя лекар ако сте бременна.

Не се препоръчва да кърмите докато приемате този лекарствен продукт.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Бетакса може да предизвика виене на свят, поради това е необходимо повишено внимание при шофиране, работа с машини и във височина.

Дозировка и начин на приложение

Индивидуалната дозировка се определя от лекаря в съответствие с поносимостта и терапевтичния ефект. Обичайната дневна доза при лечение на високо кръвно налягане е 1 таблетка (20 mg) един път на ден.

Дневната доза при ангина пекторис е 1 таблетка. Вашият лекар може да промени дозировката в съответствие с Вашето състояние в интервала от 1,5 до 2 таблетки дневно.

Дозировка при увредена бъбречна функция

При леко увреждане на бъбреците обикновено не е необходимо коригиране на дозировката.

По-ниски дози се препоръчват при пациенти с умерени нарушения на бъбречната функция, както и при пациенти на хемодиализа. Влошаването на чернодробната функция обикновено не изисква коригиране на дозировката, но се препоръчва клинично наблюдение при започване на лечението.

Начин на приложение

Бетакса се приема обикновено сутрин и не се влияе от храненето.



Ако пропуснете своята сутрешна доза, вземете я през деня и продължете на следващия ден, съгласно предписания график.

Предозиране

В случай на предозиране или случайно поглъщане на лекарствения продукт от дете, потърсете незабавно медицинска помощ!

Нежелани лекарствени реакции

Бетакса обикновено се понася добре. В редки случаи, по-специално при започване на лечението могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции: обща физическа слабост, бърза уморяемост, виене на свят, психически изменения (ментална депресия, проблеми със съня и др.), храносмилателни проблеми (диария, запек, гадене и повръщане, коремна болка), влошено кръвоснабдяване на долните крайници (болка, посиняване, усещане за студ), забавен сърдечен ритъм (под 45-50 удара/мин). При хронично обструктивно белодробно заболяване (ХОББ) е възможно задълбочаване на дихателните нарушения. Много рядко повлиява сексуалната потентност при мъжете. Тези реакции обикновено отшумяват след уточняването на дозировката или след прекъсване на лечението с този лекарствен продукт.

Ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции или други необичайни реакции, моля информирайте Вашия лекар.

Съхранение

Да се съхранява под 25 °С.

Срок на годност

2 години

Внимание

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Дата на последна редакция на текста: м. януари 2004 г.

Адрес за контакти

ТП Зентива Интернешънъл АД
бул. „Н. Й. Вапцаров” № 25, 1407 София
тел.: 962 41 40, 962 41 91

