

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да прилагате този лекарствен продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате още въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.
- Този лекарствен продукт е предписан лично на Вас. Не го давайте на други. То може да им навреди, дори и ако техните симптоми са същите като вашите.

**Kamiren® XL modified-release tablets 4 mg**

**Doxazosin**

**Камирен XL таблетки с изменено освобождаване**  
**доксазозин**

*Активно вещество: doxazosin.*

*Помощни вещества: хипомелоза, безводен калциев хидроген фосфат, лактоза, моногидрат, магнезиев стеарат, титаниев диоксид (E171), макрогол 400.*

*Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба  
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenia*

**1. КАКВО Е KAMIREN XL И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ?**

**Състав**

1 таблетка си изменено освобождаване съдържа 4 mg doxazosin като doxazosin mesylate.

**Опаковка**

Картонена кутия с 30 таблетки с изменено освобождаване в блистерна опаковка.

**Какво е Kamiren XL?**

Kamiren XL съдържа doxazosin, лекарствено вещество, което подгасява α-адренергичните рецептори. Това са специални структури в някои гладки мускулни, които регулират тяхното съкращение. Благодарение на специална технология, освобождаването на doxazosin от таблетките е постепенно и постоянно и само леко колебание в нивата на doxazosin в кръвта се забелязва след редовна употреба.

Doxazosin отпуска гладките мускулните клетки в стените на кръвоносните съдове. Той разширява кръвоносните съдове и понижава високото кръвно налягане. Той също така понижава нивото на кръвните масти (холестерол и триглицериди) и така има допълнителен благоприятен ефект върху сърцето и кръвоносните съдове. Една таблетка е ефективна за целия ден. По прещенка на Вашия лекар, вие можете да приемате Kamiren XL едновременно с други лекарствени продукти, които понижават кръвното налягане.

Kamiren XL предотвратява контракциите на гладката мускулатура в горната част на уретрата и на мускулите на простатата, които притискат уретрата. Това отпускане на мускулатурата подобрява микцията и значително облекчава симптомите, наблюдавани при доброкачествена хиперплазия на простатата.

Той не понижава сигнifikантно нормалното кръвно налягане.

**За какво се използва Kamiren XL?**

Този лекарствен продукт се препоръчва за:

- Лечение на високо кръвно налягане (хипертония),





- Намаляване на проблемите свързани с уголемена простата (доброкачествена простатна хиперплазия).

## 2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ KAMIREN XL

*Информирайте Вашия лекар, ако имате каквото и да било хронично заболяване, метаболитно нарушение, ако сте свръхчувствителен или, ако приемате други лекарствени продукти.*

### Кой не трябва да приема Kamiren XL?

Вие не трябва да приемате този лекарствен продукт, ако сте свръхчувствителен към doxazosin, към други квиназолинови производни (prazosin, terazosin), или към някои от помощните вещества в този лекарствен продукт.

### Предпазни мерки и предупреждения

В началото на лечението вашето кръвно налягане може да се понижи значително. Могат да се получат замайване и световъртеж, а в някои случаи - дари и загуба на съзнание. Бъдете внимателни при внезапно изправяне, и по специално, ако сте възрастен пациент или приемате едновременно други лекарства за понижаване на кръвното налягане и/или диуретици.

Ако имате чернодробно нарушение, приемайте лекарствения продукт много внимателно, защото неговия метаболизъм е забавен.

Този лекарствен продукт не се препоръчва за деца, защото сигурността и безопасността при лечението не са установени.

### Бременност

*Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.*

Вие можете да приемате Kamiren XL по време на бременност само по изключителни индикации.

### Кърмене

*Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.*

Кърменето по време на лечение с doxazosin не се препоръчва.

### Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

В началото на лечението кръвното налягане може да се понижи значително. Може да ви се завие свят и затова в такива случаи не се препоръчва шофиране и работа с машини.

### Как другите лекарствени продукти могат да взаимодействват с Kamiren XL?

*Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или сте приемали други лекарствени продукти, дори и такива които са без рецептa.*

## 3. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА KAMIREN XL

### Дозировка и начин на приложение

*Стриктно спазвайте указанията на лекаря. Вие не трябва да променяте дозите или да прекъсвате лечението без предварително да се консултирате с Вашия лекар.*

Вие можете да приемате лекарствения продукт преди, по време или след хранене. Прегълтнете таблетката цяла, с някаква течност. Не трябва да я дълъгчите, разфулизвате или натрошавате.





Обичайната доза е 1 таблетка еднократно дневно. Лекарят може да повиши дозата, ако прецени, че е недостъпъчна. Максималната доза е 2 таблетки дневно.

Ако имате чернодробно увреждане трябва да се консултирате с вашия лекар.

*Ако имате впечатление, че ефекта от лекарствения продукт е твърде силен или твърде слаб се консултирайте с вашия лекар или фармацевт*

#### **Ако сте приели повече Kamiren XL отколкото би трябало**

*Ако сте приели свръхдоза, трябва да се консултирате в Вашия лекар или фармацевт веднага.*

Твърде високите дози основно оказват влияние като понижават кръвното налягане, причиняват замайване и виене на съят, като са възможни и загуба на съзнание. Ако забележите някои от изброените симптоми, легнете веднага, като главата трябва да е в по-ниско положение, а краката да са леко повдигнати. Консултирайте се с вашия лекар за понататъшната употреба на този лекарствен продукт. Вие можете да се нуждаете от намаляване на дозата или спиране на приема за известно време.

Ако сте приели свръхдоза, обадете се на вашия лекар веднага. Приемането на няколко таблетки едновременно може да бъде опасно. Не предизвикайте повръщане, а легнете веднага както е описано по-горе.

#### **Ако забравите да вземете Kamiren XL**

*Не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.*

Ако сте забравили да приемете дозата си, продължете с обичайната доза от схемата на прием.

#### **Риск, ако лечението с Kamiren XL се прекрати**

Вие трябва да приемате редовно Kamiren XL.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

*Както всички лекарствени продукти Kamiren XL също може да прояви нежелани реакции.*

Най-вече в началото на лечението кръвното налягане може да се понижи значително при рязко изправяне от легнало положение, да се появи замаяност и световъртеж, а в някои случаи и прималяване. Тези реакции обикновено изчезват спонтанно, но ако продължат да се проявяват за по-дълъг период или са тежки, трябва веднага да се консултирате с вашия лекар (виж също раздела "Ако приемете повече Kamiren XL отколкото би трябало"). Могат също да се наблюдават: уморяемост, съниливост, главоболие, мускулна слабост, оток в глезена и подбедренницата, чувство на запушване на носа, храносмилателни проблеми (гадене, болка в стомаха, диария, повръщане), невъзможност да се достигне до ерекция, силно сърцебиене и задръжка на урината.

Съобщавани са случаи и на обрив, сърбеж, посиняване или кървене, дължащо се на кръвно заболяване, продължителна и болезнена ерекция на пениса, психични нарушения (напр. възбуда), жълтеница, размазано виждане, болка в гърдите, ускорено сърцебиене.

Ако забележите някои от тези реакции, трябва да се консултирате с вашия лекар веднага.

*Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива, които не са споменати в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт веднага.*

#### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА KAMIREN XL**

##### **Срок на годност**

*Да не се използва след посочения на опаковката срок на годност.*





**Условия за съхранение**

Този лекарствен продукт не изисква каквото и да било специални условия за съхранение.

**Да се съхранява на място, недостъпни за деца.**

**Информация за предписване**

*Само по лекарско предписание.*

**Дата на последна корекция**

10 декември 2003

