



Commande № 4167

Prospectus Pulmex pommade – Bulgarie

Format: 145 x 210 mm – Recto/Verso – P 08

Code Pharma: 528

Référence: BG 125567

1 couleur: Noir

Imprimeur: Filano Impression (CD + composite + épreuves couleurs)

Production: NCH Nyon – CH

Caractères utilisés: Helvetica Cyrillic – Times Cyrillic

Campiche – (Juin/3-01) – ez – Travaux – Dossiers – 1931 Novartis cmde 4167 – Prospectus

RECTO

Proof F

Text + Design – Novartis Consumer Health SA

PLEASE SIGN TO APPROVE — proof

Sent: _____ Received: _____

Department	Signature	Date
Marketing		
DRA		

New proofs: yes no

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 31-07-2006

Информация за пациента

Пулмекс® Маз 40 g

Pulmex ointment 40 g

Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси, обрънете се към Вашия лекар или фармацевт.

1. Какво е Пулмекс?

Пулмекс съдържа като активни съставки Camphora 12.5%, Eucalypti oil 5%, Rosmarini oil 5%, Balsamum resinifolium (съдържа vanillin) 6%. Помощни вещества: натриев хидроксид, карбомер, полисорбат, дестилирана вода.

2. Как действа Пулмекс?

Пулмекс има отбъбващ, отхвачващ и антисептичен ефект. Той улеснява дишането при възпаления на горните дихателни пътища, пропадащи със запушване на носа и кашлица.

Пулмекс се използва за облекчаване на симптомите при простудни заболявания, притичащи с кашлица, бронхит и катари.

Пулмекс не дразни нормалната кожа.

3. Преди да използвате Пулмекс**Кога не трябва да се използва Пулмекс?**

Не използвайте Пулмекс, ако сте алергичен към никоя от съставките му.

Както всички продукти, съдържащи тези съставки, не използвайте Пулмекс, ако сте имали гърчове.

Какви предпазни мерки трябва да се вземат преди употреба на Пулмекс?

Пулмекс не трябва да се използва при деца под 3-годишна възраст.

Децата над 7 години трябва да инхилярат внимателно Пулмекс под наблюдението на възрастен (да не се използва за инхиляции при деца под 7 год.).

Бременност и кърмене

Не се препоръчва употребата на Пулмекс при бременност и кърмене.

Какво трябва да помните при употреба на Пулмекс

Не нанасяйте Пулмекс в ноздрите, устата или върху изгорена или наранена кожа.

Изплакнете със студена вода, ако случайно Пулмекс попадне върху очите или в устата. Не гълтайте.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите продължат повече от една седмица.

4. Как да използвате Пулмекс?

За възрастни и деца над 3 години – прилага се два-три пъти дневно, особено преди лягане.

Намажете Pulmex върху горната и средната част на гърдите и гърба. Нежно разтройте и облечете топла дреха.

Необходимо количество за една апликация:

- при възрастни – 3-4 см²;
- при деца над 7 год. – около 2 см²;
- при деца между 3 и 7 год. – около 1 см².

Pulmex не е мазен и не оставя лепна по дрехите.

При възрастни и деца над 7-годишна възраст лечение може да се допълни с инхиляции с Пулмекс. Инхиляция с Пулмекс.

Възрастни и деца над 7 години: може да се повтаря до три пъти дневно.

Изстискайте 2-3 см от тубичката в купичка или инхалатор с гореща вода. Изчакайте да се разтвори, разбръкайте и започнете да вдишвате испаренията през носа и устата в продължение на няколко минути. Да не се правят повече от 4 апликации дневно. Няма клинични данни за взаимодействие с други лекарства.

5. Какво да правите, ако е погълнат търде много Пулмекс?

Веднага се обрънете към Вашия лекар или фармацевт в случай на случайно погълдане. Съществуват съобщения за предозирание с камфор при инжектиране, кожно или назално приложение. Симптомите на предозирание на камфор или евкалиптово масло могат да включват нозеа, повръщане, колики, главоболие, световъртеж, чувство на топлина, затруднено дишане, делириум, конвулсии, потискане на ЦНС и кома. Предприемат се обичайните спешни мерки (активен въглен, салинни лаксативи, стомашна промивка при погълдане). Гърчовете могат да се контролират чрез бавно венозно въвеждане на диазепам или при нужда на кратко действащи барбитурати.

6. Какви нежелани ефекти може да причини Пулмекс?

Съобщава се за редки случаи на кожни засечения. Спрете да използвате Пулмекс и се обрънете към Вашия лекар или фармацевт, ако тези симптоми се проявят при Вас.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите никакви други симптоми, които считате, че могат да се дължат на употребата на Пулмекс.

7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини – няма.**8. Допълнителна информация****Срок на годност**

5 години от датата на производство.

Не използвайте Пулмекс след изтичане на срока на годност, отбележан върху опаковката.

Условия за съхранение

Да се съхранява под 30 °C!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

9. Производител и притежател на разрешението за употреба

Novartis Consumer Health SA
CH-1260 Nyon, Switzerland

Последна редакция на листовката
Февруари 1996 г.

BG 125567

NOVARTIS