

**ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**

**PAPAVERIN ACTAVIS  
ПАПАВЕРИН АКТАВИС**

**ИАЛ**

**ОДОБРЕНО!**

ДАТА 25.09.2006

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ  
ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!
- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

**В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:**

1. Какво представлява Папаверин Актавис и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Папаверин Актавис
3. Как се прилага Папаверин Актавис Възможни нежелани реакции
4. Условия на съхранение
5. Допълнителна информация


**Папаверин Актавис таблетки**  
Papaverine

*Лекарствено вещество в една таблетка: Papaverine hydrochloride 50 mg*  
*Помощни вещества: монохидратна лактоза, пшенично нишесте, повидон, безводен колоиден силиций, талк, магнезиев стеарат*

**Papaverin Actavis** таблетки от 50 mg таблетки, по 10 броя в блистер от PVC/AL фолио, по 4 блистера в опаковка

**Притежател на разрешението за употреба**  
Актавис ЕАД  
Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2  
1000 София, България  
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

**Производител**  
Балканфарма Дупница АД  
Ул. "Самоковско шосе" №3  
2600 Дупница, България  
Тел.: 0701 58 196



## **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАПАВЕРИН АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА**

Папаверин Актавис притежава директен релаксиращ ефект върху гладката мускулатура.

Папаверин Актавис се прилага при симптоматично лечение на спазми на гладката мускулатура (стомашно-чревни, жлъчни, бъбречни и уретерални колики).

## **2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ПАПАВЕРИН АКТАВИС**

Папаверин Актавис не се прилага при:

- Свръхчувствителност към лекарственото вещество или някое от помощните вещества;
- Сърдечно-съдови заболявания като AV-блок, нарушения в сърдечната проводимост, пароксизмални тахикардия и екстрасистолия, ектопични ритъмни нарушения, инфаркт на миокарда;
- Повишено вътречерепно налягане, състояние след скоро прекаран инсулт (поради риск от steal ефект);
- Глаукома (повишено вътреочно налягане);
- Не се препоръчва при деца.

**При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:**

Продуктът се прилага с повишено внимание при заболявания на черния дроб.

Поради това се препоръчва проследяване на чернодробните показатели.

Необходимо е контролиране на вътреочното налягане.

По време на лечението трябва да се избягва тютюнопушенето.

Трябва да се избягват екстремни физически натоварвания и резки промени в положението на тялото, за да се избегне ортостатизъм (спадане на кръвното налягане при изправяне).

При прилагане на продукта на пациенти в напреднала възраст може да спадане телесната температура.

При поява на симптоми от страна на стомаха продуктът може да се приема с антиациди.

### **Приложение на Папаверин Актавис и прием на храни и напитки**

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.

### **Бременност**

*Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт*

По време на бременността продуктът се прилага само след точна преценка полза/риск.

### **Кърмене**

*Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт*



Ако продуктът се прилага на кърмачки, кърменето трябва да се преустанови.

### **Шофиране и работа с машини**

При приемане на Папаверин Актавис може да се развие световъртеж, двойно виждане и сънливост и по тази причина дейности като шофиране и работа с машини трябва да се избягват.

### **Приемане на други лекарства**

*Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар*

Папаверин Актавис, приет едновременно с леводопа, може да намали ефекта му.

Продуктът не се прилага едновременно със сулфонамиди.

Тъй като никотинът предизвиква вазоконстрикция, тютюнопушенето може да намали действието на Папаверин Актавис.

### **Важна информация за някои от съставките на Папаверин Актавис:**

Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактазна непоносимост.

Поради наличието в състава на пшенично нишесте, този лекарствен продукт може да представлява опасност за хора с непоносимост към глутен (глутенова ентеропатия).

## **3. КАК СЕ ПРИЛАГА ПАПАВЕРИН АКТАВИС**

*Винаги приемайте Папаверин Актавис според инструкциите на лекуващия лекар!*

По лекарско предписание!

Продуктът се прилага по 50 mg-150 mg 3 пъти дневно с течност по време или след хранене. Максималната дневна доза е 200 mg на прием и до 600 mg дневно.

### **Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:**

*При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!*

*Симптоми* – гадене, повръщане, слабост, сънливост, нистагъм, диплопия, диафореза, зачервяване, замаяване, синусова тахикардия. При прием на по-високи дози над 15 g може да се наблюдава метаболитна ацидоза с хипервентилация, хипергликемия и хипокалиемия.

*Лечение* – Стомашна промивка с вода и приемане на активен въглен, прясно мляко, медикаментозно повлияване на кръвното налягане, потиснатото дишане и комата.

Хемодиализата може да повлияе благоприятно, няма специфичен антидот.

### **Ако сте пропуснали да вземете Папаверин Актавис**

В такъв случай приемете дозата скоро, но не удвоявайте следващата.



#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

*Както всеки друг лекарствен продукт, Папаверин Актавис може за предизвика нежелани лекарствени реакции.*

Могат да се наблюдават:

*Рядко*

- Кожни рлеакции - алергични кожни обриви, зачервяване на кожата, изпотяване;
- Стомашно-чревни реакции - гадене, стомашен дискомфорт, анорексия, забавена чревна перисталтика и констипация,
- Реакции от страна на ЦНС - световъртеж и главоболие, седация;
- Сърдечно-съдови реакции - тахикардия, понижено кръвно налягане;
- Очни реакции - диплопия;

*Много рядко*

- Чернодробни реакции - чернодробни увреждания, жълтеница.

*Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт!*

#### **5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ**

При температура под 25<sup>0</sup>С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност - 3 (три) години

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Април 2006

