
SOPHARMA

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля прочетете внимателно тази листовка. Тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар.

КАРСИЛ®

CARSIL®

СЪСТАВ

Съдържание на една капсула:

Лекарствено вещество:

Silymarin (като 100 %) 100,00 mg

Помощни вещества: Микрокристална целулоза, повидон, талк, магнезиев стеарат, железен оксид-черен E172, железен оксид-червен E172, титаниев диоксид E171, железен оксид-жълт E172, желатин, пречистена вода.

ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Силимарин - растителната активна съставна част на Карсил действа стабилизиращо на клетъчната мембрана, предпазвайки по такъв начин черния дроб от вредните влияния и съдейства за възстановяването на увредените чернодробни клетки.

ПОКАЗАНИЯ

В кои случаи може да се прилага Карсил?

При токсични чернодробни увреждания. За допълнително лечение при пациенти с хронични възпалителни заболявания на черния дроб или цирроза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В кои случаи не трябва да се прилага Карсил?

При свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

По време на бременност и в периода на кърмене може да се прилага само под лекарско наблюдение и ако ползата от лечение с продукта превъзхожда риска от приложението му.

Няма данни за нарушаване способността за шофиране и работа с машини при пациенти, лекувани с Карсил.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Какви други лекарства повлияват действието на Карсил?

Няма данни за лекарствени взаимодействия между Карсил и други лекарствени продукти. Може да се прилага едновременно с витамини, кортикостероиди и имуносупресори.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Карсил се прилага през устата, като при леки и средни случаи дозировката е по 1 капсула 2-3 пъти дневно. При тежки форми на заболяването дозата може да бъде увеличена до 400 mg (4 капсули) дневно, разделена на два или три приема. Лечебният курс продължава не по-малко от 3 месеца.

За деца дневната доза е 5 mg/kg телесно тегло, разделена на 2-3 приема. Лекарствената форма е подходяща за деца над 5 годишна възраст.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Какви нежелани реакции могат да настъпят при прилагането на Карсил?

Много рядко при предразположени болни се наблюдава засилване на съществуващи от по-рано вестибуларни нарушения (гадене, световъртеж), алоpecia (косопад, най-често на главата) и нарушения в храносмилането. Тези оплаквания преминават след прекратяването на приема на продукта.

За всички нежелани лекарствени реакции, включително и неописани в листовката, пациентът трябва незабавно да съобщи на своя лекуващ лекар.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Какво да се предприеме, ако Карсил е приложен в много високи дози (умишлено или погрешно предозирание)?

Няма данни за предозирание на продукта. При приемане на голямо количество Карсил се предизвиква повръщане, стомашна промивка с активен въглен и лечение на симптомите на предозирание.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

В оригинална опаковка на сухо и защитено от светлина място при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

Две години от датата на производство.

Да не се употребява след изтичане срока на годност!

ДАННИ ЗА ОПАКОВКАТА

Продуктът се опакова по 10 /десет/ капсули в блистер от твърдо ПВХ/алуминиево фолио. Три блистера се поставят в картонена кутия заедно с листовка за пациента.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

“СОФАРМА” АД, България

1220 София, ул. ”Илиенско шосе” N 16

Дата на последната редакция на листовката

03.07.2002 г.