



Информация за пациента

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

Cefasel[®] 100µg – Цефасел 100 µg

Състав

1 ампула 1 ml съдържа:

Лекарствено вещество: Sodium selenite pentahydrate 0,333 mg

Помощни вещества: натриев хлорид, вода за инжекции.

Какво представлява Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор?

Разтвор инжекционен в ампули от 1 ml по 10, 50 или 100 ампули в опаковка. Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор съдържа микроелементът селен, който е част от антиоксидантната предпазваща система на клетките в организма. Селен има антимуtagenно и антиалергично въздействие и стимулира имунната защита на организма.

За какво се използва Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор?

При доказан дефицит на селен, който не може да бъде компенсиран чрез подходящ хранителен режим. Селенов дефицит може да настъпи при случаи на нарушения в храненето и абсорбцията (при сериозни заболявания на храносмилателния тракт, както и при бъбречна недостатъчност) или при неправилно и недостатъчно хранене (изцяло парентерално хранене и хемодиализа).

Кога не трябва да взимате или да използвате Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор?

При интоксикации със селен.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор?

Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влошава, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор или могат да бъдат повлияни?

При парентерално приложение като добавка към инфузии стойностите на рН не трябва да са по-ниски от 7.0 и не трябва да има смесване с редуциращи агенти, като напр. витамин С, защото в такъв случай не може да се избегне утаяване на елементарен селен.

Специални предупреждения

Ако се приема както е указано, няма специални противопоказания при бременност и кърмене.

Цефасел 100µg Инжекционен разтвор не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

Как можете да използвате Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор?

Ако не е предписано друго, се прилага 1 ампула дневно интравенозно или като интравенозна инфузия след разреждане. Това отговаря на дневна доза от 100 µg селен. Тази дозировка може да бъде повишена за кратък период до 3 ампули дневно, отговарящо на 300 µg селен.

Продължителността на лечението е неограничено.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор?

Няма съобщени случаи на предозиране.

Какво трябва да правите, ако сте пропуснали прием на Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор или преждевременно прекратите лечението?

Ако сте пропуснали прием, продължете както обикновено. Не прилагайте двойна доза от лекарството, за да компенсирате пропуснатия прием.

Липсва нежелан ефект при спиране на лечението с Цефасел 100µg Инжекционен разтвор.

Какви нежелани реакции може да предизвика Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор?

Няма известни нежелани реакции, ако се използва както е указано.

Съществува възможност за развитие на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта и флебитни нежелани реакции.

Съхраняване на Цефасел 100 µg Инжекционен разтвор.

Не се изискват специални условия за съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

Срокът на годност е 5 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15

D-87437 Kempten, Germany

Медицинско представителство в България:


Либра АД

Дата на последна редакция на листовката

Май 2002

ВТОРИЧНА ОПАКОВКА /картонена кутия/

№	Необходими данни	Текст
1	Име на лекарствения продукт	CEFASEL® 100 µg ЦЕФАСЕЛ 100 µg
2	Лекарствена форма и количество в една опаковка	Разтвор инжекционен 1 ml
3	Лекарствени вещества	1 ампула (1ml) съдържа Sodium selenite pentahydrate 0,333 mg
4	Списък на помощните вещества	Помощни вещества: натриев хлорид, вода за инжекции.
5	Начин на употреба	За интравенозно приложение. Ако не е предписано друго, се прилага по 1 ml дневно интравенозно или като интравенозна инфузия след разреждане. Това отговаря на дневна доза от 100 µg селен. Тази дозировка може да бъде повишена за кратък период до 3 ml дневно, отговарящо на 300 µg селен. Прочетете листовката преди употреба.
6	Специално предупреждение	Да се съхранява на място, недостъпно за деца !
7	Други специални предупреждения	Разтворът трябва винаги да бъде бистър и безцветен.
8	Дата на изтичане срока на годност	Годен до : мм/гггг
9	Условия на съхранение	Не се изискват специални условия за съхранение.
10	Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт	Cefak KG Ostbahnhofstr. 15 D-87437 Kempten Germany
11	Регистрационен номер	Рег. №
12	Партиден номер	Партида №:
13	Режим на отпускане	По лекарско предписание.


 24.09.02