

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 08.08.06

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно всичко от тази листовка преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

- Запазете листовката. Може да се наложи да я прочете отново.
- Ако имате допълнително въпроси, моля, консултирайте се с Вашя лекар или фармацевт.
- Този лекарствен продукт е предписан лично на Вас и Вие не трябва да го давате на други. Той може да им навреди, дори и ако техните симптоми са същите като вашите.

В тази листовка:

1. Какво е Pentilin и за какво се използва?
2. Преди да приемете Pentilin
3. Как да се приема Pentilin?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да се съхранява Pentilin

Pentilin prolonged-release tablets 400 mg

Пентилин таблетки с удължено освобождаване 400 mg

Pentoxyfilline

Пентоксифилин

- Активното вещество е pentoxifylline.
- Помощните вещества са: хипомелоза, макрогол 6000, магнезиев стеарат и колоиден безводен силиций в сърцевината на таблетката, и хипомелоза, макрогол 6000, титаниев диоксид (E171) и талк в обвивката.

Производител и притежател на разрешението за употреба:

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

1. КАКВО Е PENTILIN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Всяка таблетка с удължено освобождаване Pentilin съдържа 400 mg pentoxifylline. Налични са опаковка с 20 таблетки. Те са опаковани в 2 блистера по 10 таблетки.

Таблетките Pentilin са бели, овални, биконвексни, филмирани таблетки.

Pentoxifylline действа върху вискозитета на кръвта като понижава свързването на нейните компоненти и спонтанното повишаване на деформируемостта на еритроцитите. Това има благоприятен ефект върху кръвообъръщението при заболявания на периферните и мозъчните артерии, подобрява кръвоснабдяването на малките кръвоносни съдове и снабдяването на тъканите с кислород.

Този лекарствен продукт се използва за:

- за напреднали нарушения на периферната артериална циркулация на крайниците, предизвикани от артеросклероза и диабет, и съдови спазми (*claudicatio intermittens*, диабетна макро- и микроangiопатия, синдром на Reynaud).
- заболявания, свързани с нарушения на венозната циркулация,
- лечение на мозъчни и очни нарушения в оросяването.



Този лекарствен продукт се продава само с рецептa и се използва винаги след лекарско предписание.

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ PENTILIN

Не взимайте Pentilin:

- ако сте свръхчувствителни към pentoxifylline или към някои от помощните вещества на Pentilin
- ако сте свръхчувствителни към лекарствени продукти, подобни на pentoxifylline, като теофилин, теофилинат, кофиен, холин, аминофилин или теобромин;
- ако насъкоро сте получили остръ инфаркт на миокарда;
- ако страдате от обилно кървене;
- ако страдате от заболяване, свързано с повишена риска от кървене.

Обърнете специално внимание:

- ако имате или сте имали сърдечни ритъмни нарушения;
- ако се лекувате за сърдечна недостатъчност;
- ако имате повишено или ниско кръвно налягане;
- ако се лекувате за диабет;
- ако се лекувате за атеросклероза;
- ако имате бъбречна недостатъчност (или сте на диализа);
- ако имате тежка чернодробна недостатъчност;
- ако сте планиран за операция (включително изваждане на зъб) или за диагностична процедура, свързана с рисък от кървене;
- ако сте на възраст под 18 години.

Приемане на Pentilin с храна и напитки

Храната не влияе върху ефекта на лекарствения продукт.

Бременност

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате какъвто и да било лекарствен продукт.

Ефектът на Pentilin върху плода не е проучен, затова не трябва да го приемате по време на бременност освен ако лекарят не прецени, че е наистина необходимо.

Кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате какъвто и да било лекарствен продукт.

Pentilin и неговите метаболити преминават в майчиното мляко. Лекарят ще прецени съотношението полза/рисък относно лечението по време на кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не шофирайте или не използвайте машини докато не установите как реагирате на лечението.

При индивидуални пациенти, лекарственият продукт може да причини замайване и така индиректно да отслаби психофизическите способности да се шофира или да се използват машини.

Приемане на други лекарствени продукти



Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, или наскоро сте приемали каквото и да било лекарствени продукти, дори и такива без рецептa.

Информирайте Вашия лекар ако приемате лекарствени продукти за:

- лечение на повищено кръвно налягане,
- предотвратяване на съсирването на кръвта (антикоагуланти),
- лечение на диабет,
- лечение на stomашно-чревни язви,
- лечение на бактериални инфекции,
- лечение на астма и/или хроничен бронхит,
- облекчаване на болка

Моля, консултирайте се с Вашия лекар дори и, ако сте приемали такива лекарствени продукти в миналото.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА PENTILIN?

Винаги приемайте Pentilin точно както ви е инструктиран Вашият лекар. Ако не сте сигурен, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Дозировката зависи от тежестта на заболяването.

Обичайната начална доза е 1 таблетка от 400 mg Pentilin три пъти дневно.

Дозировката при пациенти с увредена бъбречна функция, и такива на хемодиализа, се определя от лекар.

Приемайте таблетките цели, с течност. Приемайте ги по-време или след хранене. Така честотата на нежеланите реакции може да бъде намалена. Ефекта от лекарствения продукт се проявява от 2 до 4 седмици, постепенно се повишава и се стабилизира на 8 седмица от лечението.

Приемайте лекарствения продукт редовно, по едно и също време всеки ден. Направете така, че да сте сигурни, че имате достатъчно количество от лекарствения продукт за продължаване на лечението.

Този лекарствен продукт е предписан на Вас лично и не трябва да го давате на други, дори и ако техните симптоми са подобни на Вашите.

Ако имате впечатление, че ефекта от лекарствения продукт е твърде силен или твърде слаб, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемете повече Pentilin отколкото би трябало

Ако приемете по-високи дози от лекарствения продукт отколкото би трябало, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт незабавно.

Ако пациентът е приел по-голямо количество от лекарствения продукт могат да се появят зачеряване на лицето, замайване и отмаляване, дължащи се на прекомерното понижаване на кръвното налягане (хипотония), сънливост, загуба на съзнание, повръщане, повишаване на телесната температура, възбуда и конвулсии. Ако пациентът е в съзнание след приемането на голям брой таблетки, опитайте се да предизвикате повръщане и незабавно се обадете на лекар.

Ако забравите да вземете Pentilin

Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

Опитайте се да ви стане навик да приемате лекарствения продукт редовно, но едно и също време всеки ден. Ако пропуснете доза, вземете я колкото е възможно по-бърбо, но не и, ако вече е време за следващата доза. Ако остават само няколко часа за приемане на следващата доза, оставете пропуснатата и се върнете към редовната схема на дозиране.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарствени продукти, Pentilin може да прояви нежелани лекарствени реакции.

По-голяма част от нежеланите реакции са дозо-зависими. Ако дозировката на Pentilin се намали, нежеланите реакции отслабват или напълно изчезват. Прекратяване на лечението се налага в много редки случаи.

Трябва да прекратите приемането на лекарствения продукт и да се консултирате с лекар веднага, ако възникне някои от следните нежелани реакции:

алергична реакция, беспокойство, треперене на ръцете, болка в гърдите и неритмично или засилено сърцебиене, жълтеница (жълтеникаво оцветяване на кожата), сънливост, отслабване на остротата на зрението, зачервяване на лицето или гърчове.

Консултирайте се с Вашия лекар при поява на замайване, главоболие, болка в епигастроума, метеоризъм, гадене, повръщане, диария или безсъние или други симптоми, които са неприятни и понижават качеството ви на живот.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВА PENTILIN

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се пази от светлина. Да се съхранява под 25°C.

Срок на годност

Да не се използва след срока на годност, посочен на опаковката.

Информация за предписване

Само по лекарско предписание.

Дата на последна корекция

Тази листовка е била одобрена на

30 август 2005

