

Уважаеми пациенти,
Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.

Наименование на лекарствения продукт:

СЕС® forte
/ЦЕК форте/

Кое е активното вещество?

63 g гранули за приготвяне на перорална супензия съдържат: 5,244 g cefaclor monohydrate, съответстващ на 2,5 g cefaclor

5 ml (1 мерителна лъжица) от приготвената перорална супензия съдържат: 262,24 mg cefaclor monohydrate, съответстващи на 250 mg cefaclor

Какво друго съдържа СЕС® forte гранули за перорална супензия?

химетелоза, натриев лаурил сулфат, натриев нишестен глюколат (тип A), захароза, силиконова емулсия, ксантанова гума, ароматизатори (ягода-малина)

Съвет към диабетиците

5 ml (1 мерителна лъжица) от приготвената перорална супензия съдържат 2,86 g захароза, съответстващи на 0,24 въглехидратни единици.

Лекарствена форма и опаковка:

Оригинални опаковки, съдържащи 1 флакон с 63 g гранули за приготвянето на 100 ml перорална супензия

Кой е отговорен за продажбата на СЕС® forte гранули за перорална супензия?

Hexal AG
Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germany
Tel.: 08024/908-0, Fax: 08024/908 1290

Кой е отговорен за производството на СЕС® forte гранули за перорална супензия?

Salutas Pharma GmbH,
Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germany

Какво представлява СЕС® forte гранули за перорална супензия?

СЕС® е антибиотик, принадлежащ към групата на цефалоспорините, които се прилагат за лечение на бактериални инфекции.

За какво се използва СЕС® forte гранули за перорална супензия?

Прилага се за лечение на остри и хронично обострени инфекции с различна степен на тежест, които са причинени от цефаклор-чувствителни бактерии и заболяванията са подходящи за перорална терапия.

За лечение са показани следните инфекции:

- на горните и долните дихателни пътища
- на уши, нос и гърло - като отитис медиа (възпаление на средното ухо), синузит, тонзилит (възпаление на слизиците) и фарингит (възпаление на гърлото)
- на бъбреците и долните пикочни пътища
- на кожа и меки тъкани
- гонорея

Кога не трябва да приемате СЕС® forte гранули за перорална сусペンзия?

Не трябва да приемате СЕС® forte, ако сте алергични към цефаклор, други антибиотици от тази група (цефалоспорини) или към някоя от съставките на препарата.

Уведомете Вашия лекар, ако сте имали реакции на свръхчувствителност към пеницилинни антибиотици, тъй като е възможно да проявите алергични реакции и към цефалоспорини (кръстосана алергия).

Ако сте информирани, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към Вашия лекар преди да започнете лечение с този продукт.

В какви случаи можете да използвате СЕС® forte гранули за перорална сусペンзия само след консултация с лекар?

При определени заболявания или състояния СЕС® forte може да се използва само след консултация с Вашия лекар.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако страдате от изявена алергия или астма, тъй като сте под повишен риск от алергични реакции към продукта.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при прием на СЕС® forte гранули за перорална сусペンзия?

Моля, информирайте Вашия лекар, ако страдате от тежки стомашно-чревни нарушения, придръжани с повръщане и диария, тъй като при тези случаи не е гарантирана достатъчна абсорбция и ефикасност на СЕС® forte.

СЕС® forte може да повлияе ефикасността на определени продукти, потискащи коагулацията на кръвта (антикоагуланти от кумаринов тип). При такива болни трябва да се проследят внимателно показателите на кръвосъсирването. Ако е необходимо лекуващият лекар ще намали дозата на СЕС® forte.

Ако е необходимо да Ви се изследва урина и/или кръв, моля информирайте Вашия лекар, че приемате СЕС® forte, тъй като определени тестове могат да дадат неточни резултати (напр. неензимни методи за определяне съдържанието на глюкоза и белтък в урината, Coombs тест).

Този лекарствен продукт съдържа 2,86 г захароза/5 ml. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя до 2,86 г захароза. Продуктът е неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарозен/изомалтозен дефицит.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на СЕС® forte гранули за перорална сусペンзия или могат да бъдат повлияни от продукта?

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или сте приемали наскоро някакви лекарствени продукти, дори и такива без рецептa.

Антибиотици

СЕС® forte не трябва да бъде комбиниран - доколкото е възможно - с лекарства, потискащи растежа на бактериите (напр. хлорамфеникол, еритромицин, сульфонамиди или тетрациклини), тъй като ефектът на СЕС® forte може да бъде намален.

Пробенецид (продукт за лечение на подагра)

Допълнителното приложение на пробенецид води до потискане отделянето на цефаклор чрез бъреците, в резултат на което се получават по-високи концентрации на цефаклор и по-продължително присъствие в кръвта.

Антикоагуланти

При пациенти, приемащи едновременно СЕС® forte и лекарствени продукти, потискащи коагулацията на кръвта (антикоагуланти от кумаринов тип) се наблюдават отделни болни с удължено протромбиново време с или без кървене.

Моля, обърнете внимание, че тези данни се отнасят и за насконо приети лекарствени продукти.

Какви храни и подправки трябва да избягвате?

Няма данни за храни и подправки, които трябва да се избягват.

С какво трябва да се съобразяват децата и възрастните пациенти при приложение на СЕС® forte гранули за перорална супензия?

СЕС® forte не трябва да се прилага при преждевременно родени деца, тъй като няма достатъчно клинични данни.

Какви специални предпазни мерки трябва да се вземат при бременност и кърмене?

Наблюденията при бременни жени не са показвали данни за увреждане на плода. Проучвания при животни не са установили ембрио-/фетотоксични ефекти.

Независимо от това при бременност и особено през първите три месеца СЕС® forte трябва да бъде приеман само ако лекуващият лекар прецени, че е необходимо това лечение и след внимателна преценка на съотношението полза/рисък.

По време на кърмене СЕС® forte трябва да се приема само при особено спешна необходимост от лечение, тъй като активната съставка може да премине в майчиното мляко. Кърмачето може да развие свръхчувствителност към активната съставка и да се наблюдава диария или колонизация на чревната лигавица с гъбички (напр. бластомицети).

С какво да се съобразявате при шофиране или при работа с машини?

Досега не е известно СЕС® forte да повлиява концентрацията и бързината на реакциите, но нежелани ефекти като понижено кръвно налягане или вертиго могат да повишат риска от нарушаване на посочените дейности.



Дозировка, начин и продължителност на приложение:

Препоръчва се следната дозировка, ако Вашият лекар не е предписал СЕС® forte в друг режим на дозиране. Моля, спазвайте посочените указания за приложение. В противен случай СЕС® forte няма да действа правилно.

В каква доза и колко често можете да приемате СЕС® forte гранули за перорална сусペンзия?

Деца под 6 години трябва да приемат 30 mg цефаклор/kg телесно тегло/ден, разделени на три отделни приема.

В случай на тежки инфекции, възпаление на средното ухо или инфекции, причинени от по-малко чувствителни патогени, се препоръчват от 40 до 50 mg цефаклор/kg телесно тегло/дневно при максимално 1 g цефаклор дневно.

В случай на възпаление на средното ухо, общата дневна доза може да бъде приема в два отделни приема на всеки 12 часа.

При леки инфекции като неусложнени инфекции на долните пикочни пътища е достатъчна дозировка от 20 mg цефаклор/kg телесно тегло/ден, разделена в 2-3 отделни приема на всеки 8 или 12 часа.

Деца от 6 до 10 години трябва да приемат 1 мерителна лъжица 3 пъти дневно (съответстваща на 250 mg цефаклор 3 пъти дневно).

При тежки инфекции, възпаление на средното ухо (отитис медиа) или инфекции, причинени от по-малко чувствителни бактерии е необходима доза от 1 мерителна лъжица 4 пъти дневно (съответстваща на 250 mg цефаклор 4 пъти дневно).

Възпаление на средното ухо може да бъде третирано също с 2 мерителни лъжици 2 пъти дневно (съответстващи на 500 mg цефаклор 2 пъти дневно).

При леки инфекции като неусложнени инфекции на долните пикочни пътища е достатъчна дозировка от 1 мерителна лъжица сутрин и вечер (съответстваща на 250 mg цефаклор 2 пъти дневно).

За ориентация служи следната таблица:

250 mg/мерителна лъжица (5 ml)

| Възраст на детето | Стандартна дозировка (мерителни лъжици) | По-висока дозировка в случай на тежки инфекции и отитис медиа (мерителни лъжици) | По-ниска дозировка в случай на леки инфекции (мерителни лъжици) |
|-------------------|---|--|---|
| 1-2 години | 1/2 л. 3 пъти дневно | 1/2 л. 4 пъти дневно (или 1 л. 2 пъти дневно) | |
| 3-5 години | 1 л. сутрин ½ л. на обяд 1 л. вечер | 1 л. 3 пъти дневно | |
| 6-10 години | 1 л. 3 пъти дневно | 1 л. 4 пъти дневно (или 2 л. 2 пъти дневно) | 1 л. 2 пъти дневно (сутрин и вечер) |

Възрастни, подрастващи и деца над 10 години трябва да приемат стандартна доза от 2 мерителни лъжици 3 пъти дневно (500 mg цефаклор 3 пъти дневно):

Дозата може да бъде удвоена при тежки инфекции (като пневмония), или инфекции, причинени от по-малко чувствителни бактерии.

В отделни случаи възрастни са приели дози до 4 g цефаклор дневно и те са били понесени добре. Тази доза не трябва да бъде надвишавана.

При леки инфекции, като инфекции на долните пикочни пътища, протичащи без усложнения, се препоръчва дозировка от 1 мерителна лъжица 3 пъти дневно (съответстваща на 250 mg цефаклор 3 пъти дневно).

При лечение на остър гонореен уретрит при мъже и жени се назначава 3 g цефаклор, по възможност комбиниран с 1 g пробенецид.

Дозировка при пациенти с нарушенa бъбречна функция

СЕС® forte може да бъде прилаган дори и при пациенти с нарушенa бъбречна функция без да се налага корекция на дозата.

Хемодиализата намалява серумния полуживот с 25-30 %.

При пациенти на регулярна хемодиализа преди диализа трябва да бъде приложена начална доза от 250 mg до 1 g. Поддържащата доза, приета между две диализи е същата, както при болни без хемодиализа.

Кога и как можете да приемате СЕС® forte гранули за перорална сусpenзия?

Приготвяне на пероралната сусpenзия

- разбъркайте гранулите чрез разклащане
- отворете защитената срещу отваряне от деца запушалка чрез натискане надолу и едновременно завъртане наляво
- напълнете флакона със студена вода до около $\frac{1}{2}$ см над маркировката (пръстен върху стъклото)
- затворете флакона и разбъркайте енергично докато се разтворят гранулите по дъното на флакона
- допълнете отново с вода до маркировката (пръстена върху стъклото) и разклатете. Тази процедура трябва да бъде повторена докато пероралната сусpenзия достигне нивото на маркировката (пръстена върху стъклото).

Разклащайте флакона енергично при всеки прием.

Моля, използвайте прибавената към опаковката мерителна лъжица (с деления на 1,25 ml, 2,5 ml и 5 ml) за измерване на предписаното количество.

Можете да приемате СЕС® forte по време на хранене, при което не се нарушава абсорбцията.

Колко дълго можете да приемате СЕС® forte гранули за перорална сусpenзия?

Като правило СЕС® forte трябва да се приема от 7 до 10 дни, или най-малко 2-3 дни след изчезване симптомите на заболяването.

При лечение на инфекции с бета-хемолитични стрептококи се препоръчва продължителност на лечението най-малко 10 дни, за да се предотвратят късните усложнения (напр. ревматична треска и гломерулонефрит).

Продължителността на приложение се определя от Вашия лекар.

Какво трябва да предприемете, ако СЕС® forte гранули за перорална сусpenзия е бил приет в много големи количества (преднамерено или неумишлено предозиране)?

Досега не съществуват съобщения за случаи на интоксикация с цефаклор. Ако са приети големи количества от продукта, трябва да се консултирате с лекар.

Моля, запазете опаковката на лекарството, за да може да се установи приетото количество от активната съставка.

Какво трябва да направите, ако сте приели по-малко от предписаната доза СЕС® forte гранули за перорална сусペンзия или сте пропуснали приема на препарата?

Ако сте забравили приема, моля приемете дозата, колкото е възможно по-скоро. Ако сте забравили да приемете лекарството няколко пъти, Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар, за да се проследи протичането на заболяването и своевременно да се предприеме необходимото лечение.

Какво трябва да знаете, ако сте прекъснали лечението или сте го прекратили преждевременно?

Ако сте прекъснали лечението преждевременно, съществува рисък от повторно заболяване.

Какви нежелани реакции може да предизвика приложението на СЕС® forte гранули за перорална сусペンзия?

Както всички лекарствени продукти, приложението на СЕС® forte може да предизвика нежелани реакции, които се оценяват със следната честотата.

| | |
|--------------|---|
| много чести: | повече от 1 на 10 лекувани пациенти |
| чести: | по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациенти |
| нечести: | по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1 000 лекувани пациенти |
| редки: | по-малко от 1 на 1 000, но повече от 1 на 10 000 лекувани пациенти |
| много редки: | по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти, включително отделни случаи |

Кръв и кръвни клетки

Много рядко са били наблюдавани промени в броя на кръвните клетки (еозинофилия, левкопения, лимфоцитоза, тромбоцитолеза, нечесто – неутропения, а в отделни случаи апластична и хемолитична анемия). Тези нежелани реакции се нормализират спонтанно след края на терапията.

Нечесто е наблюдавано значително намаляване на броя на белите кръвни клетки (агранулоцитоза).

Черен дроб и жълччен тракт

Нечесто може да се наблюдава обратимо увеличаване на чернодробните ензими в серума (трансаминази, алкална фосфатаза).

Съобщени са били отделни случаи на преходно увреждане на чернодробните клетки (хепатит) и нарушение в отичането на жълчката (жълтеница).

Храносмилателна система

Нечесто се наблюдава липса на апетит, болки в корема, диария, повръщане, тежест в стомаха, гадене или редки изпражнения. Тези прояви протичат леко и най-често изчезват по време на терапията или след прекъсването и.

Както при другите широкоспектърни антибиотици, може да възникне чревно възпаление (колит), включително псевдомемранозен колит.

Бъбреци и пикочни пътища

Нечесто може да възникне остро възпаление на бъбреците (остър интерстициален нефрит), но той отзвучава след завършване на терапията. Също така е било наблюдавано слабо повишаване на кръвната урея и/или креатинин.

Нервна система

Съобщени са били нечести случаи на временни халюцинации, хиперактивност, нервност, безсъние или сънливост, замайване или смутено поведение.

Както при другите лекарства от тази група (цефалоспоринови антибиотици), не може да бъде изключена повишена тенденция към конвулсии.

Реакции на свръхчувствителност

Често са възможни алергични кожни реакции (напр. зачервяване на кожата с усещане за парене (обрив), сърбеж, копривна треска с мехури и подуване (уртикарна екзантема), обриви, подобни на морбили (макулопапулозна, морбилиiformна екзантема).

Други симптоми на реакции на свръхчувствителност могат да бъдат увеличаване броя на еозинофилните кръвни клетки (еозинофилия), положителен тест на Coomb (откриване на определени типове антитела в кръвта), (ангионевротичен) едем, лекарствена треска, както и възпаление на вагината.

Съобщени са били нечести случаи, наподобяващи серумна болест – мултиформна еритема (различни прояви на зачервяване на кожата) или горе-споменатите кожни реакции, придружени със ставни симптоми и повишена температура. При тези случаи, за разлика от серумната болест, лимфаденопатия и протеинурия са наблюдавани много рядко. Не са открити циркулиращи антитела.

Най-общо тези алергични реакции се наблюдават по време или след повторно лечение с цефаклор (по-често при деца, отколкото при възрастни) и изчезват до няколко дни след прекъсване на лечението.

Тежките реакции на свръхчувствителност могат да се изразят със спадане на кръвното налягане до животозастрашаващ шок, подуване на лицето (фациален едем), учестен пулс, оток на ларинкса със спазъм на дихателните пътища, затруднено дишане, подуване на езика. При отделни болни тези реакции възникват още след първото приложение на препарата. При появата им е необходима незабавна лекарска помощ.

Нечести случаи на тежки кожни прояви с животозастрашаващи общи реакции (като синдром на Stevens-Johnson, ексфолиативен дерматит, синдром на Lyell) са съобщавани във връзка с приема на СЕС®.

Други нежелани лекарствени реакции

След прием на СЕС® в отделни случаи е било съобщено временно покачване на кръвното налягане.

Продължително или повторно приложение на СЕС® forte може да доведе до вторична инфекция (суперинфекција) и колонизация с цефаклор-устойчиви бактерии или до развитието на гъбична инфекция (blastomycetis).

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт.



Какви мерки трябва да бъдат взети във връзка с нежеланите лекарствени реакции?

Ако по време или след лечение с продукта се наблюдава тежка или упорита диария, моля консултирайте се с Вашия лекар, тъй като това може да бъде проява на сериозно чревно заболяване (псевдомемброзен колит), което трябва да бъде лекувано незабавно. Моля, не предприемайте самолечение с лекарства, потискащи стомашно-чревната перисталтика.

Ако се появят внезапно тежки реакции на свръхчувствителност, моля консултирайте се веднага с Вашия лекар, тъй като може да се наложи незабавно лечение.

Инструкции за съхранение:

Готовата за употреба суспензия има срок на годност 14 дни, при съхранение в хладилник (под 8°C). Неизползваното след изтичане на този срок количество трябва да се изхвърли.

Срокът на годност на лекарството е напечатан върху опаковката.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Как трябва да се съхранява CEC® forte гранули за перорална суспензия?

Продуктът да се съхранява при температури под 25 °C.

Приготвената суспензия трябва да се съхранява в хладилник (при температури не по-високи от 8°C).

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Дата на последната редакция на листовката:

Юни 2005

Ако имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт.