

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 05-12-06г.

Информация за пациента

Фервекс е лекарство. Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като в нея се съдържа важна за Вас информация. Ако искате да научите повече за този продукт или част от информацията в листовката не Ви е ясна, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Препоръчват се следните мерки при употребата на Фервекс:

- да не се прегрява стаята и въздухът да се овлажнява
- да не се пуши в стаята
- организмът да се хидратира, като се пие вода в големи количества

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

FERVEX® Adults

ФЕРВЕКС за възрастни

Гранули в сашета

• **СЪСТАВ :**

Парацетамол (Paracetamol) 0,500 g

Фенирамин maleат (Pheniramine maleate)..... 0,025 g


Витамин С (Ascorbic acid) 0,200 g

Помошни вещества: акация, безводна лимонена киселина, захарин натрий, захароза, натурален антилски аромат s.q. за едно саше.

▪ **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА**

Гранули за перорален разтвор

СЛУЧАИ, В КОИТО ТОВА ЛЕКАРСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА



Това лекарство съдържа парacetамол.

То е комбинация от антипириетик, аналгетик, антиалергично средство и витамин С.

Това лекарство е за лечение на простуда, алергичен ринит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца над 15 години.

ВАЖНО!

- СЛУЧАИ, В КОИТО ТОВА ЛЕКАРСТВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА**


Това лекарство НЕ ТРЯБВА НИКОГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА в следните случаи:

- алергия към някоя от съставките
- сериозно чернодробно заболяване
- някои форми на глаукома
- заболявания на простатата и никочните пътища
- при деца под 15 години
- при непоносимост към фруктоза, синдром на глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтазен дефицит, поради наличието на глюкоза.

КОГАТО СЕ СЪМНЯВАТЕ ВИНАГИ СЕ СЪВЕТВАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ

- СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Консултирайте се веднага с лекар в случай на предозиране или случайно приемане на свръх висока доза.



Това лекарство съдържа парacetамол. Други лекарства също съдържат тази субстанция. Не комбинирайте такива лекарства, за да не надхвърлите препоръчваната дневна доза (виж т. "Дозировка").

Температурата трябва да спадне бързо.

Не надхвърляйте посочената дозировка и се консултирайте с лекар веднага в случай на предозиране.


Не използвайте лекарството за продължително лечение без назначение от лекар, особено ако симптомите на повишена температура продължат повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни и/или се влошат, или се появи друг симптом след приемане на лекарството.

• ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

- Информирайте Вашия лекар или фармацевт в случай на бъбречно заболяване, бременност и кърмене;
- Информирайте Вашия лекар или фармацевт когато едновременно с него вземате и друго лекарство;

КОГАТО СЕ СЪМНЯВАТЕ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

- Пазете от деца.
- По време на лечението не трябва да се приема алкохол или седативни средства.
- Всяко саше съдържа 11.5 g захароза , което трябва да се вземе под внимание при хранителни режими с ниско съдържание на захар или диабет.



- **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВИНАГИ ТРЯБВА ДА УВЕДОМЯВАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ, ЧЕ ВЗЕМАТЕ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВА.

За да избегнете вредните ефекти от предозиране, НЕ КОМБИНИРАЙТЕ други лекарства съдържащи антихистамини или парацетамол БЕЗ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР.

КОГАТО СЕ СЪМНЯВАТЕ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

По време на лечението не трябва да се приема алкохол.

- **БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ**

Като предпазна мярка, това лекарство не е препоръчително по време на бременност и кърмене.

КАТО ОБЩО ПРАВИЛО, ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ ИЛИ КЪРМЕНЕ ВИНАГИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ПРЕДИ ПРИЕМА НА НЯКАВО ЛЕКАРСТВО.

- **ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ДА СЕ ШОФИРА ИЛИ РАБОТИ С МАШИНИ**

Хората, които шофират моторни превозни средства и работят с машини, биват предупреждавани за риска от съниливост при употребата на това лекарство.



Този ефект се усилва при приема на алкохол или лекарства съдържащи алкохол.

- **СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕД ВИД ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПАЦИЕНТИ**
Захароза

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ТОВА ЛЕКАРСТВО

- **ДОЗИРОВКА**

Възрастни и деца над 15 години:

1 саше 2 или 3 пъти на ден

- **НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**


Интервалът между две приложения трябва да бъде най-малко 4 часа. Съдържанието на сашето трябва да се приема с достатъчно количество гореща или студена вода.

Перорално приложение.

- **ЧЕСТОТА НА ЛЕЧЕНИЕТО**

Когато се лекуват грипоподобни състояния, препоръчва се това лекарство да се взима с гореща вода вечер, щом се появят първите симптоми.

В случаи на остра бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 10 ml/min) интервалът между две дози трябва да бъде поне 8 часа.



НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕТО БЕЗ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР.

- **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО**

Не използвайте това лекарство за продължително лечение без консултация с лекар, особено ако симптомите продължат повече от 5 дни.

- **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ**

В случай на случайно или преднамерено предозиране информирайте Вашия лекар или фармацевт.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

КАКТО С ВСИЧКИ АКТИВНИ ПРОДУКТИ, ТОВА ЛЕКАРСТВО МОЖЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНДИВИДИ ДА ПРЕДИЗВИКА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ С ПО-ГОЛЯМА ИЛИ ПО-МАЛКА ТЕЖЕСТ:

- Настъпване на остръ пристъп на глаукома при хора, които имат такова предразположение.
- Уринарни нарушения (значително намаляване на урината, затруднено уриниране)
- Сухота в устата, нарушения на акомодацията (способността на окото да се нагласява за виждане на различни разстояния), запек
- Нарушения на паметта или концентрацията, объркване, световъртеж (по-често при пациенти в напреднала възраст).
- Липса на координация в движенията, треперене.
- Сънливост, занижено внимание – по-ясно изразено в началото на лечението.



- Съобщава се за редки случаи на кожен обрив, зачервяване на кожата, или алергична реакция под формата на внезапен оток на лицето или шията или внезапно неразположение с понижение на кръвното налягане. Лечението трябва незабавно да се преустанови, да се потърси съвета на лекар и да не се приемат повече лекарства съдържащи парацетамол или фенирамин.
- Съобщава се за няколко редки случаи на промяна в резултатите на лабораторните изследвания, напр. много ниски нива на някои бели кръвни телца или тромбоцити, което може да доведе до кървене от носа или венците. В такъв случай се консултирайте с лекар.

СЪОБЩЕТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСИЧКИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ, ЗА КОИТО НЕ СЕ СЪОБЩАВА В ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ.

СЪХРАНЕНИЕ

- Да не се използва след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката.
- **СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява под 25°C.

Да се пази от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

юли 2006 г.

