

TERNAFIN tabl. 250 mg

Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство. Ако не разбираме нещо или имаме допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар. Запазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново. Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

TERNAFIN
ТЕРНАФИН
(таблетки)

КАКВО СЪДЪРЖА ТЕРНАФИН?

Всяка таблетка съдържа лекарствено вещество terbinafine hydrochloride, еквивалентно на 250 mg terbinafine. В състава на таблетката са включени следните помощни вещества: хипромелоза, микрокристална целулоза, модифицирано нишесте; кроскармелоза, натриева сол; магнезиев стеарат, безводен силициев диоксид.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕРНАФИН?

Тернафин е синтетичен лекарствен продукт с противогъбичково действие. Оказва влияние върху по-голямата част от гъбичките, предизвикващи инфекция на кожа и нокти - дерматофити и дрожди. Унищожава дерматофитите; потиска размножаването на дрождите или ги унищожава в зависимост от вида им.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕРНАФИН?

- При гъбичкови инфекции на нокътните пластинки и кожата, причинени от дерматофити;
- Кожни кандидози.

При кожни дерматофитии и кандидози Тернафин таблетки се назначава само при тежки, обширни поражения на кожата, които са устойчиви на лечение с локални средства.

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕРНАФИН?

Лечението с Тернафин е противопоказано при:

- Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.
- Тежка бъбречна недостатъчност
- Тежка чернодробна недостатъчност
- Деца.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ТЕРНАФИН

Уведомете лекуващия си лекар, ако имате някакво хронично заболяване, ако сте свръхчувствителни към други лекарства или храни или ако вземате други лекарства.

Предпазни мерки и предупреждения

- Таблетките Тернафин не са ефективни при лечение на питириазис, вериколор; не са ефективни и при вагинална кандидоза.



- При бъбречни или чернодробни нарушения лечението с Тернафин се провежда само след строга лекарска преценка и под лекарско наблюдение. Не се препоръчва назначаването му без консултация с лекар, поради опасност от поява на тежки нежелани лекарствени реакции в тези случаи.
- Не пропускайте назначеното от лекуващия лекар проследяване на кръвните показатели в лабораторията.
- При лечение с лекарството и появява на гадене, повръщане, повишена температура, болки в дясното подребрие, жълтеница (пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината), появява на обрив незабавно трябва да уведомите лекуващия лекар.
- Преди да започнете лечение с тербинафин е необходимо да съобщите на лекуващия лекар в случай, че имате кръвни заболявания или заболявания от страна на имунната система.

Бременност и кърмене

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди да вземете някакво лекарство по време на бременност, непременно се посъветвайте с лекуващия си лекар.

Тъй като не са извършени клинични проучвания относно безопасността от приложението на продукта по време на бременност не се препоръчва употребата му. Тернафин преминава в майчиното мляко. При необходимост от лечение с Тернафин кърменето се прекратява.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Тернафин не оказва неблагоприятно влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

КАКВИ ЛЕКАРСТВА МОЖЕ ДА ВЗАЙМОДЕЙСТВАТ С ТЕРНАФИН?

Моля, уведомете лекуващия си лекар за ВСИЧКИ лекарства, които вземате в момента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекар или сте ги купили без рецепт. Това е важно, защото Тернафин може да промени активността на някои лекарства или някои лекарства може да променят неговите ефекти.

Дозата на Тернафин трябва да се коригира ако се прилага едновременно с рифампицин (лекарство против туберкулоза), циметидин (лекарство против язва) и терфенадин (противоалергично средство).

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозата и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар. Важно е да вземате лекарството така, както лекарят Ви го е предписал. Не трябва да променяте дозите или да преустановявате лечението, без да се консултирате преди това с лекаря, дори ако се чувствате добре. Опитайте се да вземате лекарството по едно и също време всеки ден.

Дозировката се определя за всеки пациент индивидуално в зависимост от диагнозата и тежестта на инфекцията, като продължителността на лечението варира от 2 седмици до 6 месеца.



Възрастни: По една таблетка веднъж дневно или по $\frac{1}{2}$ таблетка 2 пъти дневно. Препоръчва се по време на хранене.

Продължителност на лечението:

- При инфекция на ходилата (включително и между пръстите на краката) – лечението продължава 2 до 6 седмици;
- Инфекция на големите кожни гънки, кожата в областта на гърдите и корема – 2 до 4 седмици.
- При инфекция на ноктите на ръцете и краката – от 6 седмици до 3 месеца.

В случай, че инфекцията засяга палците на краката или при бавно израстване на ноктя (при пациенти над 65 - годишна възраст), лечението може да продължи 6 месеца. Ефектът на лекарството се поддържа няколко седмици след прекратяване на лечението.

Пациенти над 65 - годишна възраст – не е необходима промяна в дозировката.

Пациенти с чернодробни и бъбречни нарушения – дозата може да бъде намалена по преценка на лекуващия лекар в зависимост от тежестта на нарушенията.

Ако вземете повече Тернафин, отколкото трябва

Ако сте взели доза, по-голяма от предписаната, посъветвайте се с лекуващия си лекар.

Предозирането на лекарството може да протече със симптоми от страна на стомашно-чревния тракт, като гадене, повръщане, болки в корема или обриви, главоболие, по-често уриниране. Може да се направи промивка на стомаха. Лечението е симптоматично.

Ако сте пропуснали да вземете Тернафин

Ако забравите да вземете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Продължете да вземате лекарството, както ви е предписано от лекуващия лекар.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Тернафин може да има нежелани ефекти. Те обаче не се наблюдават задължително при всички пациенти, така че Вие можете да не получите никаква реакция.

Обикновено тербинафин се понася добре. Като правило нежеланите лекарствени реакции са леки до умерени, преминават спонтанно при продължаване на лечението. Най-чести са нежеланите лекарствени реакции от страна на стомашно-чревната система: метеоризъм, нарушение на вкуса до загубата му, тежест, липса на апетит, гадене, повръщане, диария и болки в корема; от страна на нервната система – главоболие.

От страна на кожата могат да се наблюдават: обриви (в редки случаи могат да бъдат много тежки), сърбеж.

Изключително рядко се срещат: жълтеница (пожълтяване на очите и кожата и потъмняване на урината); зрителни нарушения; болки в мускулите и ставите; слабо изразен косопад.



Ако получите нежелани ефекти, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, информирайте лекуващия си лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защищено от светлина място, при температура под 25°C.

Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка.

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Съхранявайте таблетките на сигурно място, където децата не могат да ги видят и достигнат.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

ОПАКОВКА

Таблетки с делителна черта, по 10 броя в блистер, по 2 блистера в опаковка.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ

СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

Последна редакция: 02.2005 г

