


Информационна листовка

Кондилин
Condylin

Лекарствено вещество: Podophyllotoxin



Какво съдържа Кондилин?

1 ml съдържа 5 mg Подофилотоксин

Помощни вещества: Млечна киселина, натриев лактат и етанол.

Лекарствена форма:

Дермален разтвор (Cutaneous solution).

Съдържание на опаковката:

3,5 ml

Как действа Кондилин?

Подофилотоксина е лекарственото вещество съдържащо се в Подофилина, смола от растението Подофилум.

Подофилотоксина инхибира клетъчното деление и притежава противовъзпалително действие.

Притежател на разрешението за употреба:

Nycomed Austria GmbH

Peter Strasse 25 , A-4020 Linz, Австрия

Производител:

Nycomed Austria GmbH

Peter Strasse 25 , A-4020 Linz, Австрия

Кога се прилага Кондилин?

За лечение на кондиломи по външните полови органи на мъже и жени.

Кога Кондилин не трябва да се прилага?

Не трябва да прилагате Кондилин:

- При свръхчувствителност към някоя от съставките;
- Възпалени или кървящи рани;
- Отворени рани след хирургични процедури;
- В комбинация с други лекарства съдържащи подофилин;
- При бременност и кърмене;
- При деца под 12 годишна възраст;

На какво трябва да обърнете специално внимание преди да приложите Кондилин?

Кондилин се препоръчва само за лечение на кондиломи и не трябва да се нанася върху други брадавици и вродени белези.

Кондилин не трябва да влиза в контакт с очите. В случай на попадане в очите трябва старателно и продължително да се изплакне обилно с вода и да се потърси лекарска помощ.

Избягвайте употреба на алкохол по време на лечение с Кондилин.

Пациентите мъже трябва да използват презерватив докато се установи пълното им излекуване. Техните сексуални партньори също трябва да бъдат прегледани от лекар. Моля, уведомете Вашият лекуващ лекар при първите признаци на нежелани лекарствени реакции или настъпила бременност.

Съхранявайте лекарството на място недостъпно за деца.

Какие лекарства може да взаимодействат с Кондилин?

Да се избягва съвместното приложение с други лекарства съдържащи подофилин, тъй като те също съдържат подофилотоксин.

Как се прилага Кондилин?

Кондилин се препоръчва за външно лечение на кондиломи.

Лечението с Кондилин може да се провежда от Вас в дома. Само ако кондиломите имат много голям размер, налагащ единична доза повече от 0,5 ml, лечението трябва да се провежда от лекар.

Преци нанасянето на лекарството, часта на тялото която ще бъде трерирана, трябва внимателно да се измие с вода и сапун и внимателно да се подсуши.

Разтворът трябва да се нанесе върху кондиломите с помощта на памучен тампон. Тампонът може да се използва само един път!

Погрижете се разтворът да не попада върху околната кожа и лигавица. Не прилагайте Кондилин върху брадавици. След прилагането на разтвора подсушете след няколко минути. Кондилин не трябва да се отстранява чрез измиване с вода. Измивайте внимателно ръцете си след всяко нанасяне на Кондилин.

Колко често и колко дълго се прилага Кондилин?

Ако не Ви е предписано друго, моля спазвайте следната дозировка:

Лечението с Кондилин трябва да се провежда два пъти дневно (на интервал от 12 часа) в продължение на 3 последователни дни.

След това следва период от четири дни без лечение.

Лечението с Кондилин трябва да се повтаря докато кондиломите изчезнат, като максималния период за приложение е пет седмици.

Моля свържете се с Вашият лекар незабавно ако след пет седмици лечение няма резултат.

Какви нежелани лекарствени реакции могат да настъпят при лечение с Кондилин?

Както всяко друго лекарство, Кондилин освен желаните ефекти, може да предизвика нежелани лекарствени реакции. Тези нежелани лекарствени реакции не се наблюдават при всеки пациент.

Може да бъдат наблюдавани следните нежелани лекарствени реакции: Локално възпаление на лекуваният участък придружено със сърбеж, изгаряне, срастване и възпаление на главата на члена и надлежащата кожа и разязвания.

Моля информирайте Вашият лекар или фармацевт, ако наблюдавате нежелани лекарствени реакции неописани в тази информационна листовка.

Предозиране и мерки при предозиране.

Симптоми

Рискът от системна токсичност след локално приложение се повишава при лечение на обширни повърхности с големи количества от лекарството за дълъг период от време при лечение на



лесно раними, кървящи или прясно отстранени кондиломи и при небрежно приложение върху нормална кожа или лигавица.

Симптомите на токсичност включват: гадене, повръщане, коремни болки, диария както и тромбоцитопения, левкопения, бъбречни и чернодробни нарушения. Ефектите върху Централната нервна система са с късно начало и са продължителни, включват: остри психогенни реакции, халюцинации, обърканост, световъртеж, ступор, загуба на равновесие, гърчове и кома. Промените в ЕЕГ може да продължат няколко дни. Периферната и автономната невропатия се развива по-късно и може да предизвика мравучкане по крайниците, намаляване на рефлексите, мускулна слабост, сърцебиене, затруднено дишане, колабиране, нарушения в чревния пасаж и задръжка на урина.

Лечение

При предозиране при локално приложение, участъка трябва да се измие добре с вода и сапун. При попадане в очите те трябва да се измият с вода или при възможност с подходящ разтвор за почистване на очите.

При инцидентно погълдане трябва незабавно да се потърси лекарска помощ, да се направи стомашна промивка и да се наблюдават електролитния баланс, кръвните газове, чернодробната функция и кръвната картина.

Информация относно срока на годност и условията за съхранение:

Използвайте това лекарство само преди срока на годност означен върху опаковката.

Да се съхранява при температура под 25 °C, на място заштитено от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Моля свържете се с Вашият лекар или фармацевт ако имате допълнителни въпроси за Кондилин.

Дата на последна редакция на текста:

Февруари 2002 година

