



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Cynarix liquid / Цинарикс сироп

Cynarae folium extractum. spissum / Екстракт от артишок



Производител и притежател на разрешението за употреба
Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H, Absam/Tirol, Austria

Състав

Cynarae folium extractum.
spissum (4:6:1) - 200 mg/ 5 ml
и помощни вещества: захароза,
бензоена киселина,
1,35 г етанол (алкохол) в една чаена
льжичка (5 ml), аромат на портокал,
аромат на карамел, пречистена вода.

Лекарствена форма

Перорален разтвор

Свойства и действие

Стандартизирания екстракт от артишок подпомага образуването на жълчен сок, по мек, но продължителен начин, предотвратява застоя на жълчка в жълчните пътища и засилва отделянето на необходимите за храносмилането панкреатични ензими.

Показания


При нарушения в храносмилането, придружени с газове в червата и подуване на корема. Поддържащо лечение при жълчно-чернодробна дисфункция.

Начин на приложение

Перорално

Дозировка

Възрастни и деца над 12 години: 1-2 чаени лъжички перорално три пъти дневно по време на хранене.





Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките. Функционално чернодробно смущение, запушване на жълчните пътища или емпием на жълчния мехур.

Бременност и кърмене

Въз основа на съвременните научни находки няма данни за увреждащи ефекти, когато този лекарствен продукт се приема от бременни или кърмачки. Вашият лекар трябва да прецени състоянието полза / риск.

Нежелани лекарствени реакции

В редки случаи са наблюдавани преходни симптоми на стомашно-чревно дразнене – гадене, диария, флатуленция и прояви на свръхчувствителност.

Лекарствени взаимодействия

Досега не са известни

Специални предупреждения и предпазни мерки за безопасна употреба

Този лекарствен продукт съдържа 33,6% (v/v) етанол (алкохол). При спазване на предписаната дозировка с всяка чаена лъжичка се поема до 1,36 гр. етанол. Една чаена лъжичка съдържа 1,1 гр. захароза (захар).



Производител и притежател
на разрешението за употреба

Pharm. Fabrik
Montavit Ges.m.b.H,
Absam/Tirol, Austria

Това трябва да бъде взето в предвид и да не се приема от пациенти с диабет, пациенти които страдат от фруктоза-глюкозна нетolerантност, глюкозна-галактозна малабсорбция или захарозна изомалтозна.

Необходим е първоначален преглед за определяне на диагнозата, както и редовни прегледи за препоръка за продължителност на терапията, тъй като симптомите може да са белег на сериозно заболяване. Ако след прием на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши се обрнете към лекар.

Да не се използва след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Големина на опаковките

50, 100, 250 ml

Последна редакция на листовката

Декември 2006 г.

