


Б. ЛИСТОВКА



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

NEUROCYNESINE
НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки



Активни вещества:

За 1 таблетка от 300 mg:

ACETANILIDE	1 CH
CEDRON	3 CH
IGNATIA AMARA	4 CH
IRIS VERSICOLOR	4 CH
SPIGELIA ANTHELMIA	4 CH
USNEA BARBATA	3 CH
в равни части	

Помощни вещества:

Захароза, лактоза, магнезиев стеарат

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта оплакванията продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **НЕВРОЦИНЕЗИН**, таблетки, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да приемете **НЕВРОЦИНЕЗИН**, таблетки
3. Как да приемате **НЕВРОЦИНЕЗИН**, таблетки
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на **НЕВРОЦИНЕЗИН**, таблетки
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Таблетка от 300 mg.

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при главоболие и невралгични болки.



2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки

Не приемайте НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки.

Обърнете специално внимание при лечението с НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Поради наличието на лактоза този медикамент е противопоказан при вродена галактоземия, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или лактазна недостатъчност (рядко срещани метаболитни заболявания).

Поради наличието на захароза този медикамент е противопоказан при непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно-изомалтазен дефицит (рядко срещани метаболитни заболявания).

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки

Перорално приложение.

Възрастни и деца над 12 години: по 2 таблетки на всеки два часа.

Деца под 12 години: по 1 таблетка на всеки два часа.

Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.

Приемите се разреждат при подобрение.

Деца под 1 година: таблетката се стрива и разтваря във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции или някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.



5. СЪХРАНЕНИЕ НА НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки

Съхранявайте на място далеч от достъпа и погледа на деца.

Не използвайте **НЕВРОЦИНЕЗИН, таблетки**, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител

Laboratoires BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2006

Per. N°9600050

