



DIPHERELINE 0.1 mg
powder and solvent for solution for injections (s.c.)

ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg
прах и разтворител за инжекционен разтвор (s.c.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете тази листовка внимателно, преди да започнете да употребявате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате още въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите като вашите.

В тази листовка:

1. *Какво представлява ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор (за подкожно приложение) и за какво се използва той.*
2. *Информация, която ви е необходима преди да вземете ДИФЕРЕЛИН 0.1mg.*
3. *Как да прилагате ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg.*
4. *Възможни нежелани реакции.*
5. *Съхраняване на ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg.*

ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор(за подкожно приложение)

Състав на праха:

Лекарственото вещество е triptoreline..... 0.1 mg
(като triptorelin acetate)

Помощни вещества


манитол.

Състав на разтворителя

Натриев хлорид, вода за инжекции

Притежател на разрешението за употреба

BEAUFOUR IPSÉN INTERNATIONAL
37, rue Spontini
75116 PARIS
FRANCE



Производител

IPSEN PHARMA BIOTECH
83870 SIGNES
FRANCE

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР (ЗА ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ) И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЙ

Това лекарство е аналог на естествен хормон.

Той се използва при жени за лечение на някои видове безплодие. Когато се използва за оплождане в епруветка (*in vitro*), това лекарство обикновено се комбинира с други хормони, наречени гонадотропини.

2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИ Е НЕОБХОДИМА ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg.

Противопоказания:

Не бива да бъдете лекувани с ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg, ако сте алергични към triptorelin, към някое от помощните вещества на лекарствения продукт или към лекарствени продукти от същия клас.

Не вземайте ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg, ако сте бременна.

Предпазни мерки при употреба

Пациентки, получаващи това лечение, трябва да се подлагат на строго медицинско наблюдение, при което стриктно и редовно да се контролират биологичните, клиничните и рентгенологичните показатели.


Бременност

Това лекарство не трябва да се прилага по време на бременност. Ако вие откриете, че сте бременна и вземате това лекарство, съобщете незабавно на лекуващия ви лекар, който ще прекрати незабавно лечението..

Във всички случаи, когато сте бременна или кърмите трябва да търсите съвет от лекуващия си лекар или фармацевта, преди да вземете някакво лекарство.

Кърмене

Това лекарство не се прилага по време на кърмене.



Шофиране и работа с машини

Не е установено влияние

Списък на тези помощни вещества, които са важни за безопасната и ефективната употреба на лекарственият продукт

Не са приложени данни за такива.

Употреба на други лекарства

Няма данни за взаимодействие с други лекарства. Въпреки това преди да започнете лечение с ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg., трябва *уведомите лекуващия лекар или фармацевста, ако вземате или насокоро сте вземали някакво друго лекарство, дори и лекарства, които се купуват без рецепт.*

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg.

Дозировка

Една инжекция дневно.

Спазвайте строго предписанието на лекуващия лекар!

Начин и/или път на въвеждане

Подкожно приложение

Прахът трябва да се разтвори в приложения разтворител непосредствено преди инжектиране. Полученият разтвор не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

Продължителност на лечение

Продължителността на лечение трябва да бъде приспособена от лекуващия лекар за всеки отделен случай.


При всички случаи моля, спазвайте точно предписанието на вашия лекар.

Не прекъсвайте лечението, без първо да се консултирате с лекуващия си лекар.

Ако имате впечатление, че ефектът на ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg е много силен или много слаб, говорете с лекуващия си лекар или фармацевта.

Ако вземете повече ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg, отколкото трябва:

Консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевта незабавно.



Ако забравите да вземете ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg

Действия, които трябва да се предприемат, когато една или повече доза са пропуснати

Винаги се обръщайте към лекуващия си лекар.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg може да има нежелани реакции

Комбинацията на този продукт с гонадотропини може да предизвика болка в таза и/или в корема. Ако това се случи, консултирайте се с лекуващия си лекар колкото е възможно по-бързо.

Може да получите алергични реакции или по-рядко гадене, повръщане, наддаване на тегло, повишено кръвно налягане, нарушения на настроението, зрителни смущения, повишаване на температурата или болка на мястото на инжектиране. Продължителната употреба на това лекарство при възрастни може да увеличи риска от остеопороза.

Ако забележите никакви нежелани ефекти, които не са споменати в тази листовка, моля информирайте лекуващия си лекар или фармацевта.

5. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg

Да се пази на места, където децата не могат да го стигнат или видят.

Да се съхранява при температури под 25⁰ C.

Да се инжектира незабавно след разтварянето.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Не употребявайте ДИФЕРЕЛИН 0.1 mg прах и разтворител за инжекции(подкожно приложение), ако забележите видими признания на нарушената целост на опаковката, върнете лекарствения продукт на вашия фармацевт.

Дата на редактиране на текста : Май 2003г.

