

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

*Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете Вашето лечение.
За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.
Това лечение е предписано от лекар специално за Вас и не трябва да давате
лекарството на други хора. Лекарството може да им навреди, дори и ако имат същите
оплаквания като Вас.*

Konveril Plus / Конверил Плюс
Enalapril maleate; Hydrochlorothiazide
Таблетки

Какво съдържа Konveril Plus?

Всяка таблетка **Konveril Plus** съдържа: 20 mg Enalapril maleate и 12,5 mg Hydrochlorothiazide.

Помощни вещества : натриев хидроген, лактоза, царевично нишесте и магнезиев стеарат.

Лекарствена форма и опаковка

Konveril Plus може да намерите в опаковка от 20 и 4 таблетки.

Какво представлява Konveril Plus?

Konveril Plus представлява комбинация от Enalapril maleate - ACE инхибитор (инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим), и Hydrochlorothiazide - диуретик от групата на тиазидите. Когато се употребяват съвместно, Enalapril maleate и Hydrochlorothiazide имат по-голям ефект при лечението на пациенти с високо кръвно налягане, отколкото приемани поотделно.

Какво лекува Konveril Plus?

Konveril Plus е показан за лечение на пациенти с хипертония (високо кръвно налягане), за които е подходяща комбинирана терапия.

Кога не трябва да взимате Konveril Plus?

Не взимайте **Konveril Plus**, ако:

- сте свръхчувствителни към Enalapril и Hydrochlorothiazide или някое от помощните вещества на продукта;
- сте свръхчувствителни към медикаменти от сулфонамидната група (консултирайте се с лекар, ако не сте сигурни кои са тези медикаменти);
- сте с анамнеза за ангиоедем (оток, който може да засегне лицето, крайниците, устните, езика и гърлото), свързан с предишно лечение с ангиотензин-конвертиращ ензим;
- имате затруднения в уринирането.

Какво трябва да знаете докато приемате Konveril Plus?

По време на лечение с **Konveril Plus** може да се появят:

Кашлица: Упорита суха кашлица, която изчезва със спиране на приема на лекарството.
Ангиоедем: Ангиоедем, включително оток на ларинкса, може да се появи по всяко време при лечението с ACE инхибитори, включително Enalapril. При поява на симптоми като оток на лицето, устните, езика, задух, затруднено преглъщане, трябва да спрете приема на лекарството, докато не се консултирате с лекуващия Ви лекар.



Понижено кръвно налягане: При поява на главозамайване, особено по време на първите дни от терапията, при поява на синкоп (припадък), трябва да се спре приема на **Konveril Plus** и да се консултирате с лекуващия Ви лекар. Обилното изпотяване и обезводняване могат да доведат до рязко спадане на кръвното налягане поради намаление на обема на течностите. Повръщане и диария също могат да причинят спадане на кръвното налягане; в такива случаи моля, информирайте Вашият лекар. Лекарственият продукт съдържа лактоза и не е подходящ при пациенти с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен /галактозен синдром на малабсорбция/.

Преди да започнете лечение с Konveril Plus моля, информирайте Вашия лекар, ако:

- страдате от захарен диабет;
- предстои Ви голяма хирургическа операция;
- страдате от бъбречно заболяване (стеснение на бъбречни артерии) или имате присаден бъбрек;
- страдате от чернодробно заболяване;
- страдате от сърдечно заболяване (стеснение на аортната или митралната клапа);
- на диета сте с ограничено количество сол;
- сте на лечение с диуретици;
- приемате солни заместители, съдържащи калий. Препоръчва се да се избягва тяхната употреба заедно с **Konveril Plus**;
- наскоро сте имали диария или повръщане;
- имате признаци на инфекция (например: възпалено гърло, температура), което може да бъде изява на неутропения (нисък брой на белите кръвни клетки);
- сте на хемодиализа с високопропускливи мембрани;
- налага се LDL- афереза (очистване на кръвта при повишени нива на холестерола) или десенсибилизираща терапия срещу ухапване от насекоми.

Приложение по време на бременност и кърмене

Konveril Plus не се препоръчва за употреба във втория и третия триместър на бременността. Употребата му по време на кърмене трябва се избягва. Консултирайте се с Вашия лекар преди употреба на лекарствени продукти по време на бременност или кърмене.

Може ли да се взима Konveril Plus с други медикаменти?

Моля, информирайте Вашия лекар, ако взимате или доскоро сте взимали други лекарствени продукти, дори и такива, отпускани без лекарско предписание. Особено важно е да информирате Вашия лекар, ако взимате други лекарствени продукти, понижавачи кръвното налягане, обезболявачи, антиревматични, диуретици, анестетици, лекарства против депресия и лекарства, които съдържат съставките алопуринол, прокаинамид или литий, инсулин, перорални антидиабетни лекарства.

Влияе ли Konveril Plus на способността за шофиране и работа с машини?


Няма данни **Konveril Plus** да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Как се приема Konveril Plus?

Konveril Plus се приема през устата. Може да се взема преди или след хранене.

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар.

Пациенти с нормална бъбречна функция:	1 таблетка Konveril Plus един път дневно.
Пациенти с нарушена бъбречна функция:	Ако креатининов клирънс от 30 до 80 ml/min, началната доза обикновено е ½ таблетка Konveril Plus един път дневно. Ако креатининовият клирънс е под 30 ml/min Konveril Plus не се прилага.



Какво да направите, ако пропуснете една доза?

Трябва да приемате лекарството, както Ви е предписано. Ако пропуснете да приемете една доза, вземете следващата, веднага щом си спомните и се върнете към Вашето назначение.

Какво да правите при предозиране?

В случай на предозиране, незабавно се свържете с лекуващия Ви лекар. Най-характерните симптоми са замаяност, прималвяване, световъртеж, вследствие на внезапно и силно падане на кръвното налягане.

Какви нежелани ефекти може да причини Konveril Plus?

Всяко лекарство може да има нежелани и неблагоприятни ефекти. По принцип **Konveril Plus** се понася добре. Най-често срещаните странични ефекти са виене на свят и умора. Други странични ефекти, появяващи се по - рядко са: чувство на замаяност и причерняване, вследствие на пониженото кръвно налягане при рязко изправяне, мускулни крампи, гадене, слабост, главоболие, кашлица и импотентност. Макар и рядко, могат да се появят и други странични ефекти, някои от които сериозни. Вашият лекар разполага с по-пълна информация по този въпрос.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ.

Как се съхранява Konveril Plus?

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

**Продава се по лекарско предписание.
Посъветвайте се с Вашия лекар преди употреба.**

Притежател на разрешението за употреба

НОБЕЛ ФАРМА ООД
Бул. Симеоновско шосе № 24
София 1700, България

Производител

NOBELFARMA ILAC SANAYII ve TICARET A.S.
Sancaklar Koyu 81100 / Duzce, Turkey

Регистрационен №:

Дата на последна редакция на листовката:

