

ИАЛ  
ОДОБРЕН  
ВАТА 11.05.04.

**Coldrex\* Broncho syrup**  
**Колдрекс\* Бронхо сироп**

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да взимате **Колдрекс Бронхо**. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

**Какво съдържа опаковката?**

Всяка опаковка съдържа тъмно кафяво шише от 100 или 160 мл.  
Всяка доза **Колдрекс Бронхо** сироп от 5мл. съдържа като активни съставки Guaifenesin - 100 mg, Liquid Glucose - 3.00 g. и Treacle - 1.35 g.

Също така **Колдрекс Бронхо** съдържа и анисоново олио, тинктура капсикум, ксантанова гума, камфор, карамел (E150), ледена оцетна киселина, натриев бензоат, натриев метабисулфат, полиетилен гликол, подсладители (натриев цикламат, ацесулфам K), анисонова течна есенция, левоментол (ментол) и вода.

Съдържанието на карбохидрат е 3.6 гр. на 5мл.  
Натриевото съдържание е 4.8мг. на 5мл.

**Кой произвежда Колдрекс Бронхо?**

Притежател на разрешението за употреба е:  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare  
GlaxoSmithKline Export Ltd.  
Brentford, TW8 9GS, UK

Лекарственият продукт се произвежда от:  
Wrafton Laboratories Ltd.  
Wrafton, Braunton,  
North Devon, EX33 2DL,  
England

**Как действа Колдрекс Бронхо?**

Гвиленезин е отхрачващо средство, което втечнява секрета и подпомага изхашлянето. Течната глюкоза и триакъл са със смекчаващо действие, насочено към предпазване и успокояване на възпаленото гърло.

**За какво е показан Колдрекс Бронхо?**

Колдрекс Бронхо За облекчаване на кашлицата и улесняване на отхрачването, основно при грип и простудни заболявания, засягащи горните дихателни пътища.

**Какво трябва да проверите преди да започнете да приемате Колдрекс Бронхо?**

**Не приемайте Колдрекс Бронхо, ако:**

- сте алергични към гвиленезин или някоя от по-горе посочените съставки



Coldrex Broncho  
Листовка за пациента

***Ако сте бременна или кърмите:***

- Колдрекс Бронхо може да се приема по време на бременност или кърмене, но е за предпочитане да се посъветвате с Вашия лекар преди употребата на лекарствения продукт.

***Как трябва да приемате Колдрекс Бронхо?***

*Възрастни (включително над 60 години) и деца на и над 12 години:*

Напълнете мерителната чашка до граничната черта за 10мл. и вземете една доза от 10мл. (две чаени лъжички от 5мл.). Приемайте следващите дози на всеки 2 или 3 часа, ако е необходимо.

*Деца от 3 години и под 12 години:*

Напълнете мерителната чашка до 5мл. граница и дайте една доза от 5мл. (една чаена лъжичка от 5мл.). При необходимост, давайте същата доза на всеки 2 или 3 часа.

Не давайте на деца под 3 години, освен по лекарско предписание.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

**Какво трябва да направите, ако приемете прекалено голямо количество?**

Приемането на количество, по-голямо от препоръчаното върху опаковката и тази листовка може да Ви навреди. Ако това се случи, важно е да се посъветвате с Вашия лекар.

**Подходящ ли е Колдрекс Бронхо за Вас?**

При повечето пациенти, приемащи Колдрекс Бронхо не се нежелани реакции.

Въпреки това, рядко някои хора могат да наблюдават гастро – интестинални смущения при приемането на гвиленезин. Тези реакции спират след прекратяване употребата на продукта.

Ако сте загрижени за тези ефекти или почувствате други реакции докато приемате Колдрекс Бронхо, прекратете употребата и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

**Срок на годност**

Не използвайте след крайната дата, посочена на опаковката.

**Запомнете: Да се пази на места, недостъпни за деца.**

\* Колдрекс е регистрирана търговска марка.

