

SINEMET® *
(carbidopa and levodopa, MSD)
таблетки 25/250 mg



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да взимате лекарствения продукт дори ако го използвате от дълго време. Може би част от информацията от предишните листовки е променена.

Запомнете, че лекарят е предписал този лекарствен продукт само на Вас. Не го давайте на никой друг.

Какво представлява SINEMET?

SINEMET (carbidopa and levodopa, MSD) е таблетка, която съдържа две активни субстанции в следните концентрации:

1 таблетка	carbidopa	levodopa
SINEMET 25/250	25 mg	250 mg

В допължение SINEMET съдържа следните неактивни съставки: микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, царевична скорбяла, прежелатинирана скорбяла и оцветителят FD & C Blue # 2.

SINEMET се доставя като таблетки от 25/250 mg в опаковка от 100 таблетки.

SINEMET е лекарствен продукт, който комбинира ароматната аминокиселина карбидопа - декарбоксилазен инхибитор с леводопа, метаболитен прекурсор на допамина. Той е предназначен за лечение на симптомите на Паркинсоновата болест.


Притежател на разрешението за употреба:

МЕРК ШАРП И ДОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
София - България

Производител:

Merck Sharp & Dohme B. V.,
Харлем - Холандия

* Запазена марка на MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.



Зашо моят лекар ми е предписал SINEMET?

Лекарят Ви е предписал SINEMET за лечение на симптомите на Паркинсоновата болест.

Паркинсоновата болест е хронично заболяване, характеризиращо се със забавени и неустойчиви движения, мускулна скованост и трепор. Ако не се лекува, Паркинсоновата болест може да затрудни ежедневната дейност.

Как действа SINEMET при лечението на Паркинсоновата болест?

Таблетките SINEMET съдържат две активни съставки, леводопа и карбидопа.

Смята се, че симптомите на Паркинсоновата болест се дължат на недостига на допамин, химическо вещество, нормално произвеждано от определен клас нервни клетки. Допаминът препредава сигнали до определени части на мозъка, осъществяващи контрола върху мускулните движения. Така намаленото производство на допамин води до затруднение в движенията.

Леводопа възстановява нормалното количество допамин в мозъка, докато карбидопа осигурява доставянето на необходимото количество леводопа, където е необходимо. При много пациенти, това води до редуциране на симптомите на Паркинсоновата болест.

Какво трябва да знам, преди да започна да взимам SINEMET?

Кой не трябва да се лекува със SINEMET?

Не започвайте лечение със SINEMET, ако:

- сте алергичен към някоя от съставките му
- имате съмнителни кожни промени (бенки), които не са преглеждани от лекар или ако сте били болен от кожен рак
- сте лекувани за депресия с МАО-инхибитори
- имате тясноъгълна глаукома

Какво трябва да кажа на моя лекар, преди да започна лечение със SINEMET?

Уведомете Вашия лекар, ако имате или сте имали някакви здравни проблеми: алергии, депресии или психически смущения, белодробни, бъбречни, чернодробни, сърдечни или хормонални заболявания, язва, гърчове или глаукома.



Уведомете лекаря, ако сте били лекувани с леводопа.

Какво още трябва да знам, когато взимам SINEMET?

По време на лечението със SINEMET, бъдете особено внимателни, когато шофирате или работите с машини. Ако почувствате повишена сънливост или дори внезапни епизоди на заспиване, въздържайте се от шофиране и работа с машини, и се свържете с Вашия лекар.

Употреба при деца.

SINEMET не се препоръчва при пациенти под 18 годишна възраст.

Употреба при бременност и кърмене.

Не е ясно точно какъв ефект може да има SINEMET върху бременността. Levodopa, една от съставките на SINEMET, преминава в човешкото мляко. Ако сте бременна или възнамерявате да забременеете или кърмите, уведомете Вашия лекар преди да започнете лечение със SINEMET. Той ще прецени ползата от лекарствения продукт и възможния рисък.

Мога ли да взимам SINEMET едновременно с други лекарства?

Макар че SINEMET може да се дава с други лекарствени продукти, има и изключения. Вашият лекар може да Ви предупреди за несъвместимост с някои лекарствени продукти, използвани за лечение на психически заболявания и депресии, желязо и железни добавки, туберкулоза, високо кръвно налягане, мускулни спазми и гърчове.

Вашият лекар и фармацевт имат по-подробна информация за лекарствените продукти, които трябва да избягвате при лечение със SINEMET. Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които взимате или имате намерение да взимате, включително и за тези, закупени без рецепт.

Мога ли да шофирам или да работя с машини по време на лечение със SINEMET?

Индивидуалният отговор спрямо лекарствения продукт може да варира. Някои нежелани ефекти, които са докладвани за SINEMET могат да засегнат способността на някои пациенти да шофират или да управляват машини. (Виж Какви нежелани ефекти може да има SINEMET?)

SINEMET може да предизвика сънливост и внезапни епизоди на заспиване. Поради това избягвайте да шофирате или да се занимавате с дейности, при които намаленото внимание може да изложи Вас или други хора на риск от нараняване



или смърт (например работа с машини), докато подобни повтарящи се епизоди и сънливост бъдат овладени.

Как трябва да взимам SINEMET?

Дозировката на SINEMET може да е различна и лекарят ще я определи, в зависимост от стадия на заболяването и Вашата поносимост към лечението.

Таблетките могат да се разчупват на половина, ако така е предписано.

За най-добър резултат, взимайте SINEMET всеки ден. Много е важно да спазвате препоръките на Вашия лекар за това кога и по колко от продукта да взимате.

Уведомете своевременно лекаря за всички промени във Вашето състояние, особено ако имате гадене или аномални движения, тъй като това може да наложи промени във Вашето лечение.

Не спирайте приема на лекарството внезапно, ако не сте посъветван да го направите от Вашия лекар.

Какво трябва да направя в случай на предозиране?

Ако сгрешите и вземете много таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар, за да Ви се окаже своевременна квалифицирана медицинска помощ.

Какво трябва да направя, ако пропусна една доза?

Старайте се да взимате SINEMET така, както Ви е предписан лекарят. Ако обаче пропуснете да вземете една доза, не взимайте допълнителна доза. Просто вземете следващата таблетка, както обикновено.

Какви симптоми мога да очаквам при спирането на SINEMET?

Не спирайте лечението със SINEMET и не понижавайте дозата, без да се консултирате с лекар. Това може да доведе до поява на мускулна скованост, висока температура и психически промени.

Какви нежелани ефекти може да има SINEMET?

SINEMET обикновено се понася добре. Както всеки лекарствен продукт обаче, SINEMET може да има непредвидени или нежелани ефекти, така наречените странични ефекти.

Най-честите странични ефекти са аномални движения, като тикове и спазми (които могат да наподобяват симптомите на Паркинсоновата болест или да са различни) и гадене.



Други възможни странични ефекти са: психични промени, нарушения на съня, загуба на коса, промяна в цвета на урината, изпотяване и/или повишено слюноотделяне, диария, колапс, увеличено сексуално желание, сърдечни палпитации (сърдебиене), причерняване при рязко ставане, виене на свят, съниливост, внезапни епизоди на заспиване, повръщане, загуба на апетит, забавени движения и влечење към хазарт.

Могат да настъпят реакции на свръхчувствителност, като копривна треска, сърбеж, обрив и подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, което може да причини затруднения при дишане и прегълъщане: свържете се незабавно с Вашия лекар, ако настъпят подобни симптоми.

Вашият лекар или фармацевт разполагат с повече информация относно нежеланите ефекти. Някои от тях могат да се окажат и с по-сериозни последици. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако са се появили такива или други необичайни симптоми.

Как мога да науча нещо повече за SINEMET?

Ако след прочитането на тази листовка все още имате някакви въпроси или не сте достатъчно сигурен за нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, които разполагат с много по-подробна информация за този лекарствен продукт.

Какъв срок на годност има моето лекарство?

Не използвайте този лекарствен продукт по-късно от датата, посочена с четири цифри след EX (или EXP) върху опаковката. Първите две цифри означават месеца, а последните две - годината.

Как трябва да съхранявам SINEMET?

SINEMET трябва да се съхранява при температура под 30° С на сухо и защитено от светлина място.

Съхранявайте SINEMET в оригиналната му опаковка и пазете блистера от повреда.

Съхранявайте SINEMET и всички лекарства на място недостъпно за деца.

Кога за последен път е осъвременена тази брошура?

За последен път тази брошура е осъвременена юли 2006г.

