

Информационна листовка

Прочетете тази информация преди употребата на лекарствения продукт.

**DEXAPOLCORT
ДЕКСАПОЛКОРТ
Dexamethasone
Дермален спрей**

Състав

		30 ml	55 ml
<i>Лекарствено вещество</i>	Dexamethasone	4.5mg	9.0.mg

Помощни вещества Сорбитан триолеат, лецитин, изопропил миристат, смес пропан и бутан (Дривосол 35).

Свойства и действие

Дексаметазон е синтетичен адренкортикостероид с противовъзпалително, противосърбежно, антиалергично и противооточно действие.

Дексаметазон понижава пропускливостта на кръвоносните съдове, потиска формирането на ескудата и инфилтрацията.

Добре прониква през епидермиса в същинската кожа. Практически не се абсорбира в циркулацията от кожата.

Показания

- Алергични кожни заболявания
- Тежка контактна екзема, ухапвания от насекоми, уртикария, строфулус и други, отговарящи на лечение с кортикостероиди дерматози

Противопоказания

- Свръхчувствителност към дексаметазон или други съставки на лекарствения продукт.
- Бактериални или вирусни кожни инфекции, дерматомикози или кожна туберкулоза, неоплазми или преанцерозни състояния на кожата, обикновено акне и розацея, периорален дерматит, реакции след профилактична ваксинация.

Нежелани лекарствени реакции

Системното приложение на кортикостероиди върху обширни кожни области може да доведе до тяхната абсорбция в циркулацията и до системни хормонални ефекти.



Приложението върху кожата на лицето може да доведе до развитие на периорален и атрофичен дерматит. Освен това, може да предизвика локални нежелани реакции, като например стероидно акне, пурпура, телеангиектазии, кожно възпаление (парене, зачервяване, изсушаване).

Лекарствени и други взаимодействия

Няма данни за такива при локално приложение

Дозировка и начин на приложение

Напръсквайте 1-3 сек., 2-4 пъти дневно, като държите контейнера във вертикално положение на 15-20 cm от лекуваната зона. Да се разклати преди употреба.

Внимание! Да се избягва контакт с очите и инхалиция на спрея.

Предозиране

Кортикостероидите при системно приложение върху обширни кожни области, могат да доведат до повишена лекарствена абсорбция и до системни хормонални ефекти.

Изявени локални и системни хормонални нежелани реакции, включително потискане на хипофизонадбъбречната ос (например синдром на Къшинг, хипергликемия, глюкозурия) може да са симптоми на лекарствено предозиране.

В тези случаи веднага да бъде прекратено приложението на лекарствения продукт и да се проследят нивата на кортизол в урината.

Противопоказания

- Свръхчувствителност към дексаметазон или другите съставки на лекарствения продукт.
- Бактериални или вирусни кожни инфекции, дерматомикози или кожна туберкулоза, неоплазми или преканцерозни състояния на кожата, обикновено или розацея акне, периорален дерматит, реакции след профилактична ваксинация.

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

- Приложението на лекарствения продукт продължително върху обширни кожни повърхности или под оклузивна превръзка може да повлияе на неговата абсорбция в циркулацията и да предизвика системни хормонални ефекти.
- Приложението и дозировката на кортикостероидите при деца трябва да са стриктно съобразени с лекарското предписание.
- Да се използва единствено по лекарско предписание. Да се спазват дозировката и начинът на приложение.
- Да не се прилага върху кожата на лицето.
- Да се избягва контакт с очите.
- Да се избягва инхалиция на спрея.
- Лекуваната кожна повърхност да не се покрива с превръзка или по друг начин, освен ако не е препоръчано от лекар.
- При възникване на иритативни промени в зоната на апликация на продукта, приложението му трябва да бъде прекратено.



- При случайно попадане на лекарствения продукт върху лигавична повърхност, да се изплакне обилно с хладка вода.
- Безопасността на продукта при деца не е установена.
- **Внимание! Продуктът е под налягане. Да се пази от огън!**

Бременност и кърмене

Локални кортикостероиди да не се прилагат от бременни и кърмачки.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни лекарственият продукт да оказва въздействие върху способността за шофиране и работата с механични устройства.

Срок на годност

2 години

Да не се използва след датата, указана върху опаковката.

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25° С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Опаковка

Аерозолни моноблокове, съдържащи 30 ml или 55 ml дермален спрей, опаковани индивидуално в картонени кутии с всички необходими означения и информационна листовка.

Име и адрес на производителя

Tarchomin Pharmaceutical Works Polfa S.A.

2, Fleminga Str.

03-176 Warsaw

Poland

Дата на последна редакция

