


Листовка за пациента



Diltiazem - Tchaikapharma / Дилтиазем - Чайкафарма

Таблетки с удължено освобождаване

Състав:

Лекарствено вещество:

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 60 mg дилтиазем хидрохлорид.

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат, лактоза монохидрат, Макрогол 6000, хидрирано рициново масло.

Лекарствена форма и опаковка:

50 таблетки с удължено освобождаване от 60 mg в блистер опаковка, поставена в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

“Чайкафарма – висококачествените лекарства” АД

ул. “Н.И. Вапцаров” № 1,

гр. Варна 9000,

България

или

“Чайкафарма – висококачествените лекарства” АД

бул. “Санкт Петербург” № 53

Пловдив 4000

България

Фармакотерапевтична група:

Дилтиазем - Чайкафарма принадлежи към група лекарствени продукти, наречени калциеви антагонисти. Той подтиска навлизането на калциеви йони в клетките на сърцето и кръвоносните съдове. В резултат кръвоносните съдове се разширяват, намалява се преднатоварването на сърцето, увеличава се притока на кръв към него и се подобрява снабдяването му с кислород. Дилтиазем понижава повишеното артериално налягане и сърдечния ритъм /забавяне на пулса/.

Показания за лечение:

Дилтиазем - Чайкафарма е показан за:

- Лечение на стенокардия /гърдна болка от сърдечен произход/; предотвратяване на стенокардни пристъпи при пациенти с хронична коронарна недостатъчност, вазоспастична стенокардия (причинена от спазъм на кръвоносните съдове); стенокардия след прекаран инфаркт на миокарда.
- Лечение на артериална хипертония /повишено артериално налягане/.

Противопоказания

Дилтиазем - Чайкафарма е противопоказан в случай на:

- Свръхчувствителност към дилтиазем или други калциеви антагонисти;
- Ниско артериално кръвно налягане;
- Сърдечна недостатъчност;
- Остър инфаркт на миокарда с белодробен застой;
- Забавен пулс /особено под 55 удара в минута/;
- Бременност и кърмене;
- Свръхчувствителност към някои от помощните вещества;

Специални предпазни мерки при употреба

Понижаването на кръвното налягане, свързано с терапията с дилтиазем може в единични случаи да доведе до симптоматична хипотония. Затова се налага следене на кръвното налягане, особено в началото на лечението с дилтиазем, когато се определя дозата.



Лекарствени и други взаимодействия

Едновременната употреба на дилтиазем и други антихипертензивни средства води до силно понижаване на артериалното налягане.

Не е желателно да се съчетава дилтиазем с: антиаритмични средства; бетаблокери; дигиталисови гликозиди /дигоксин и др./; салицилати /аспирин и др./; нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства /индометацин и др./; инхалационни анестетици; както и с циклоспорин, теофилин и карбамазепин.

Дилтиазем може да се приема едновременно с перорални антидиабетни средства, противосъсирващи /антикоагуланти/, лекарствени средства, намаляващи мастите в кръвта /антилипемични/, обезводняващи /диуретици/, както и с нитроглицерин.

Преди да прибавите или премахнете лекарствени средства към лечението си е необходимо да се консултирате с Вашия лекуващ лекар.

Специални предупреждения

Дилтиазем може да подтисне провеждането и трябва да се употребява внимателно при пациенти с AV-блок I степен или брадикардия.

При пациенти с нарушена функция на лява камера дилтиазем трябва да се употребява внимателно.

При пациенти в напреднала възраст се налага намаление на дозите.

При пациенти с нарушена чернодробна функция дневната доза не бива да надвишава 90 mg като се налага редовен контрол.

В случай на упорити дерматологични реакции, лечението с дилтиазем да се прекрати.

Ефективността и безопасността на дилтиазем при деца не е достатъчно изследвана.

Бременност и кърмене

Дилтиазем не се препоръчва в периода на бременност и кърмене. Преди назначаване на дилтиазем при жени в детородна възраст трябва да се изключи възможността за бременност.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за повлияване способността за управление на МПС и работа с машини.

Помощни вещества от значение за безопасността и ефективността при употреба на продукта:

Хидрираното рициново масло може да причини гадене, повръщане, колики, и силно слабително действие (при високи дози). Да не бъде предписван при чревна непроходимост.

Дозирание и начин на приложение:

Дозата, начинът на приложение и продължителността на терапията се определя от лекуващия лекар. Дозата е индивидуална и може да се променя в зависимост от състоянието на пациента.

Предозиране

При предозиране на дилтиазем се наблюдават брадикардия, хипотония, сърдечен блок и сърдечна декомпенсация. В такъв случай се налага стомашна промивка с активен въглен, както и специфична терапия.

Пропускане на прием

В случай, че се пропусне една доза, следващата доза трябва да се вземе възможно най-скоро. Ако времето на прилагане на следващата доза е приближило, тогава трябва да се прескочи пропуснатата доза и да се продължи с прилагането на лекарственото средство съгласно уточнения режим. Да не се вземат две дози наведнъж.

Нежелани лекарствени реакции

Дилтиазем в терапевтични дози се понася добре.

Най-честите странични реакции при лечение с дилтиазем са: главоболие, отпадналост, гадене, световъртеж и зачервяване на кожата.

Специални условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Срок на годност

3 (три) години.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, означен на опаковката.

Дата на последна ревизия на текста на листовката

Май, 2005