

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 06.08.2004

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

GASTROPHARM® tabulettae

ГАСТРОФАРМ® таблетки

**Състав:**

В една дъвчаща таблетка ГАСТРОФАРМ се съдържат жизнеспособни лактобактерии от селекциониран щам на *Lactobacillus bulgaricus* - 1575 mg

**Други съставки:** Захароза и магнезиев стеарат.

**Лекарствена форма и количество в една опаковка:**

Дъвчащи таблетки в блистери по 6 броя. Кутии от 18 или 60 таблетки.

**Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:**

ХЮВЕФАРМА АД

бул. "Джеймс Баучер" № 33

София 1407, България

Телефон: 02/862 53 31

Факс: 02/862 53 34

E-mail: sales@huvepharma.com

**Фармакотерапевтична група и начин на действие:**

Действието на продукта се обуславя основно от съдържащите се в него изсушени бактериални клетки на *Lactobacillus bulgaricus* и биологически активните продукти от тяхната жизнена дейност – млечна и ябълчена киселини, нуклеинови киселини, полипептиди и полизахариди, които са естествени биологически активни съставки.

Високото съдържание на белъци в продукта оказва благоприятно действие върху лигавицата на stomашно-чревния тракт.

ГАСТРОФАРМ има и защитаващ и предпазващ лигавицата ефект, което се потвърждава от намалението на възпалителните процеси и зарастването на язвата след едномесечен лечебен курс.

ГАСТРОФАРМ, приложен перорално, притежава способността да възстановява и стимулира развитието на полезната микрофлора в stomашно-чревния тракт и води до оптимизиране на физиолого-биохимичните процеси в него.

**Показания:**

Лечение на дуоденални язви в неактивен стадий или при активна язвена болест с непоносимост / резистентност към омепразол плюс антибиотици.

Като профилактично средство по време и след лечение с продукти, дразнещи stomашно-чревния тракт, при приемане на храна, предизвикваща повишаване киселинността на stomашния сок. Профилактично средство срещу проявите на дисбиоза, включително след антибиотично лечение.

**Информация, необходима преди употребата на лекарствения продукт:**

Не се предвижда.



**Противопоказания:**

Няма.

**Специални предпазни мерки при употреба:**

Не се предвиждат.

**Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия:**

Няма данни.

**Специални предупреждения относно употребата при специфични групи пациенти:**

Този лекарствен продукт може да бъде прилаган по време на бременност и кърмене.

**Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:**

Не оказва отрицателен ефект върху способността за шофиране и управление на машини.

**Данни за помощните вещества:**

Съдържанието на 900 mg захароза в една дъвчаща таблетка трябва да се има предвид при употреба на продукта от диабетици.

**Дозировка:**

Приемат се перорално 3 пъти на ден, половин час преди ядене, по 1-2 таблетки, които се дъвчат. Дозата може да се увеличи до 12 таблетки на ден, като се има предвид биологично активния характер на продукта. За получаване на траен терапевтичен ефект, препоръчва се приемането на продукта не по-малко от 4 седмици.

Еднократна доза за деца –  $\frac{1}{2}$  таблетка.

Дневна доза за деца – 1  $\frac{1}{2}$  таблетки, разпределени на три приема.

**Начин на приложение:**

Вътрешно. Таблетките се приемат чрез дъвчене половин час преди хранене.

**Продължителност на лечението:**

Ефектът от лечението настъпва обикновено в края на първата седмица.

Желателно е продукта да се приема не по-малко от месец.

**Съхранение:**

В оригинална опаковка на защитено от пряка слънчева светлина място при температура до 25°C. Да се съхранява на недостъпно за деца място.

**Срок на годност:**

2 години от датата на производство.

Да не се използва след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

**Дата на последна редакция:**

16.04.2007 г.

