


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА



Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го преотстъпвате на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите както Вашите.

В тази листовка:

1. Какво представлява MAXITROL и за какво се използва
2. Преди да използвате MAXITROL
3. Как да използвате MAXITROL
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на MAXITROL
6. Допълнителна информация

MAXITROL eye ointment
МАКСИТРОЛ маз за очи

- Лекарствените вещества са дексаметазон (dexamethasone) 1 mg/g, неомицин сулфат (neomycin sulfate) 3,500 I.U./g и полимиксин Б сулфат (polymyxin B sulfate) 6,000 I.U./g.
- Помощните вещества са метил-парахидроксибензоат (E218), пропил-парахидроксибензоат (E216), безводен течен ланолин и бял вазелин.

Притежателят на разрешението за употреба за MAXITROL маз за очи е Алкон България ЕООД, ул. Димитър Манов 10, ет. 1, София 1408, България.

Производителят на MAXITROL маз за очи е SA ALCON-COUVREUR NV, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Белгия.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАХИТРОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

MAXITROL се използва за лечение на възпаление и вероятна инфекция на Вашето око(очи). Това възпаление може да е причинено от инфекция или от попадане на чуждо тяло, или от нараняване на окото.

MAXITROL е кортикостероидна-противовъзпалителна комбинация. Кортикостероидите (дексаметазон в този случай) предотвратяват или намаляват възпалението в окото. Противовъзпалителните вещества (неомицин сулфат и полимиксин Б сулфат в този случай) са ефективни срещу най-често срещаните микроорганизми, които могат да инфектират окото(очите).

MAXITROL е мазна, прозрачна до непрозрачна и бяла до бледо жълта хомогенна маз за очи, без бучки, която се доставя в опаковка, съдържаща туба от 3,5 g с пластмасов накрайник и пластмасова капачка.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАХИТРОЛ

Не използвайте MAXITROL:

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към неомицин сулфат, полимиксин Б сулфат и/или дексаметазон или към някоя от останалите съставки на MAXITROL капки за очи, суспензия.



- ако се съмнявате, че имате очна инфекция. Само Вашият лекар може да прецени кое е подходящото лечение за Вашия тип очна инфекция.

Обърнете специално внимание при употребата на MAXITROL:

- ако имате високо вътреочно налягане (глаукома). Обърнете се към Вашия лекар за съвет.
- ако изпитвате сърбеж в областта на клепача, подуване, зачервяване на окото, преустановете употребата на лекарствения продукт и се консултирайте с Вашия лекар.
- използвайте този лекарствен продукт толкова дълго, колкото Ви е предписал Вашият лекар. Ако състоянието Ви се влоши или не се подобри, посъветвайте се с Вашия лекар.
- ако използвате MAXITROL продължително време, може да станете по-податливи към други очни инфекции и това може да забави заздравяването на очната рана.

Важна информация за някои от съставките на MAXITROL:

Лекарственият продукт съдържа метил-парахидроксибензоат и пропил-парахидроксибензоат (като консерванти), за които е известно, че могат да причинят уртикария.

Не трябва да носите контактни лещи по време на лечение с този лекарствен продукт.

Възможно е Вашият лекар да поиска да провери налягането във Вашето око(очи) по време на лечение с този лекарствен продукт. Следвайте неговите съвети.

Безопасната употреба на този лекарствен продукт при деца, не е доказана.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на който и да е лекарствен продукт.

Шофиране и работа с машини:

Възможно е непосредствено след поставянето на MAXITROL да се появи краткотрайно замъгляване на зрението. Вие трябва да изчакате докато зрението Ви се проясни и едва тогава да шофирате или да работите с машини.

Употреба на други лекарства:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте приемали някакъв друг лекарствен продукт. Не забравяйте също така да споменете и лекарствата, които сте закупили без рецепта.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ MAXITROL

Винаги използвайте MAXITROL точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е малко количество (лентичка с дължина приблизително 1,5 cm) в конюнктивния сак на засегнатото око(очи), три до четири пъти дневно. Продължителността на лечението е по преценка на Вашия лекар.


Използвайте MAXITROL само за вашите очи.

ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Обърнете сега>



3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ MAXITROL (продължение)



< фигура 1 >



< фигура 2 >

Колко да поставите

<виж страна 1

1. Вземете тубата MAXITROL и огледало.
2. Измийте ръцете си.
3. Отвъртете капачката.
4. Дръжте тубата между палеца и показалеца.
5. Наклонете главата назад. Разтворете клепача, с почистения вече пръст, така че да се образува 'джоб' между него и окото. Лентичката маз трябва да попадне именно на това място (фигура 1).
6. Приближете накрайника на тубата близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
7. **Не докосвайте окото, клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности с накрайника.** Това може да замърси лекарствения продукт.
8. Внимателно стиснете тубата, за да изпусне лентичка от MAXITROL маз за очи (фигура 2).
9. След като поставите MAXITROL, пуснете клепача, мигнете няколко пъти, за да е сигурно, че лекарственият продукт е покрил цялата повърхност на окото. Внимателно затворете окото(очите) за няколко секунди; това е необходимо, за да попречите MAXITROL да премине към другите части на тялото.
10. Ако е необходимо да поставите MAXITROL маз за очи и в двете очи, повторете всички предходни стъпки и за другото око.
11. Затворете добре тубата веднага след употреба.
12. Използвайте само една и съща туба.

Ако MAXITROL маз за очи не попадне в окото, опитайте отново.

Ако сте пропуснали да поставите MAXITROL, поставете дозата когато се сетите. Ако е време за следващата Ви доза, продължете по Вашата обичайна схема. **Не** поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте поставили повече от необходимото количество MAXITROL:

Ако е необходимо, MAXITROL може да се измие от окото(очите) с хладка вода.

Ако използвате и други лекарствени продукти за очи, изчакайте десет до петнайсет минути между поставянето на различните лекарствени продукти, и последно поставете MAXITROL маз за очи.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарствени продукти, MAXITROL може да предизвика нежелани лекарствени реакции.



Чести нежелани реакции

Очни нежелани реакции: дискомфорт (краткотрайно парене или щипане по време на приложение)

Нечести нежелани реакции

Очни нежелани реакции: сърбеж в окото, високо вътреочно налягане, зачервяване, подуване на клепача, увеличено съзене, сърбеж в областта на клепача.

Обикновено, Вие можете да продължите употребата на лекарствения продукт, освен ако реакциите не са сериозни. Ако нещо Ви притеснява, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако забележите нежелани лекарствени реакции, не описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА MAXITROL

Тубата трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции. За Ваше улеснение Ви препоръчваме да напишете датата на отваряне върху опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Да не се замразява.

Да се съхранява в плътно затворена опаковка.

Не използвайте лекарствения продукт след срока на годност, обявен върху тубата и картонената кутия (отбелязан като 'Годен до').

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се:

Алкон България ЕООД
ул. Димитър Манов 10, ет.1
София 1408
Тел: + 359 2 950 1565
Факс: + 359 2 954 9755

Дата на последно одобрение на листовката xxxxxxx

