

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 09.03.04г.

DALACIN T®

ДАЛАЦИН Т®

Clindamycin

Дермален разтвор

Моля, прочетете внимателно тази листовка за ДАЛАЦИН Т преди да започнете употребата на това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да пожелаете да я прочетете отново.

Ако имате въпроси за Вашето акне или неговото лечение, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Далацин Т трябва да Ви бъде предписан от лекар. Не давайте лекарството на други хора. То може да им навреди дори ако имат същите оплаквания като Вашите.

КАКВО ИМА В ДАЛАЦИН Т?

Лекарственото вещество в Далацин Т е *clindamycin* /клиндамицин/, под формата на *clindamycin phosphate*. Това е антибиотик. Всеки милилитър от разтвора съдържа 10 mg *clindamycin*.

Помощните вещества в Далацин Т дермален разтвор са изопропилов алкохол, пропилен гликол и вода. Хлороводородна киселина или натриев хидроксид може да са добавени за коригиране на pH.

Далацин Т можете да намерите под формата на разтвор за приложение върху кожата (дермален разтвор) в бутилки, съдържащи 30 ml разтвор.

Кой произвежда ДАЛАЦИН Т?

Притежател на разрешението за употреба:

Pharmacia Enterprises S.A., Circuit de la Foire Internationale, Luxembourg

Производител:

Pharmacia N.V./S.A., Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgium

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДАЛАЦИН Т И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Този разтвор за приложение върху кожата се използва за лечение на акне.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ И ДОКАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ДАЛАЦИН Т

Не трябва да използвате Далацин Т:

- ◆ Ако имате или сте имали алергична реакция към което и да било лекарство, което съдържа *clindamycin*, *lincomycin* (линкомицин) – друг антибиотик.
- ◆ Ако имате алергия към някое от помощните вещества в този разтвор, описани по-горе в раздела "Какво има в Далацин Т?".

Алергичната реакция може да се изразява в подуване на лицето, кожен обрив, хрипове или други проблеми с дишането.

- ◆ Ако сте бременно, има вероятност да сте бременно или ~~кърмите чрез гърден млечен~~ достатъчно сигурен дали използването на това лекарство по време на бременност е безопасно. Поради това, Вие не трябва да използвате Далацин



Т, ако сте бременна или предполагате, че сте бременна, без да го обсъдите с Вашия лекар. Тъй като clindamycin може да премине в кърмата дори когато се нанася само върху кожата, вие не трябва да кърмите, докато използвате Далацин Т.

- ♦ Ако използвате други средства за третиране на кожата, които съдържат бензоил пероксид. Говорете отново с Вашия лекар.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДАЛАЦИН Т

Далацин Т дермален разтвор съдържа алкохол, който може да причини парене или раздразване на очите. Не прилагайте лекарството около очите, върху устата и порязвания или драскотини по кожата. Ако лекарството попадне върху някоя от тези чувствителни области, измийте обилно мястото със студена вода. Внимавайте, когато използвате лекарството около устата, тъй като има неприятен вкус.

Далацин Т дермален разтвор е запалим. Не използвайте разтвора близо до горящ огън или докато пушите.

Прочетете внимателно упътването и следвайте инструкциите на Вашия лекар.

Обикновено лекарството се прилага два пъти дневно. Измийте засегнатия участък от кожата, подсушете го внимателно и нанесете тънък слой от разтвора.

Бутилката има автоматичен дозиращ тампон-апликатор. Внимателно притиснете тампона върху кожата.

Винаги затваряйте добре капачката след употреба.

Ако забравите да използвате лекарството

Не се притеснявайте, ако пропуснете едно или две нанасяния. Просто продължете приложението все едно, че не сте пропускали приложение. Не използвайте два пъти по-често или два пъти повече.

Шофиране и работа с машини

Няма известни ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

Когато акнето се подобри

Не спирайте употребата на Далацин Т, когато започне подобрене на акнето. Попитайте Вашия лекар кога трябва да спрете лечението.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Повечето нежелани реакции са леки. Разтворът може да изсуши кожа ви, да я раздразни или да предизвика дерматит (зачеряване и раздразване).

Може да се получи омазняване на кожа, парене на очите, инфициране на пъпки или циреи, стомашно разстройство или коремни спазми. Съобщете на Вашия лекар, ако някоя реакция Ви смущава или не отзивчава.

Когато се приема през устата или като инжекция, clindamycin може да предизвика възпаление на червата, водещо до диария с кръв и слуз в изпражненията. Това се случва изключително рядко с Далацин Т.

АКО ПОЛУЧИТЕ ДИАРИЯ, ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА СПРЕТЕ УПОТРЕБАТА НА ДАЛАЦИН Т И ДА СЪОБЩИТЕ ТОВА НА ВАШИЯ ЛЕКАР.

Ако забележите друго нещо, което може да е нежелана реакция, съобщете на Вашия лекар или фармацевт.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДАЛАЦИН Т

Не трябва да използвате разтвора след изтичането на срока на годността, отбелаязан върху опаковката.

Да се съхранява далеч от достъпа на деца.



Да се съхранява при стайна температура (под 25°C) и далеч от топлина.
Съхранявайте в оригиналната опаковка.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Тази листовка не съдържа пълната информация за това лекарство. Ако имате
някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Информацията в тази листовка се отнася само за Далацин Т.

Дата на последна редакция на листовката:

