


## Листовка за пациента



**EUMOVATE™**  
cream

**ЕУМОВАТ™**  
крем

**clobetasone butyrate**

*Тази листовка се отнася само за Eumovate™. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приложение на лекарството. Тя ви информира за най-важното относно Eumovate™. За повече информация или съвет се обърнете към вашия лекар.*

**Наименование на лекарството**

Името на лекарството е Eumovate (Еумоват) под формата на крем.

**Какво трябва да знаете за Eumovate™**

Eumovate™ принадлежи към групата лекарства, наречени кортикостероиди за локално приложение. "За локално приложение" означава, че се нанасят върху кожата.

Кортикостероидите за локално приложение намаляват зачервяването и сърбежа при определени заболявания на кожата. (Тези лекарства не бива да се бъркат с анаболните стероиди, с които под формата на таблетки или инжекции злоупотребяват някои культуристи и атлети).

Eumovate™ крем оказва охлаждащо действие при изпарението на водата, а полученият фин маслен филм защитава кожата без да се получава маслен гланц. Прониква добре в кожата.

**Какво съдържа Eumovate™**

Лекарственото вещество в Eumovate™ е clobetasone butyrate (клобетазон бутират) в концентрация 0,05 % w/w. Eumovate™ съдържа също и помощни вещества, необходими за направата на лекарствената форма: глицерил моностеарат, цетостеарилов алкохол, пчелен восък 6621, арлацел 165, диметикон 20, лимонената киселина (монохидрат), глицерол, хлорокрезол, натриев цитрат и пречистена вода.

**Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му е в България**

Eumovate крем се произвежда от Glaxo Operations UK Ltd., T/A Glaxo Wellcome Operations, Harmire road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, UK. Притежател на разрешението за употребата му е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK, представляван в България от GlaxoSmithKline Export Ltd. с адрес: София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 10.

**За какво се използва Eumovate™**

Eumovate™ се използва за лечението на атопична екзема, фотодерматит, възпаление на външното ухо, първични възпалителни и алергични дерматити (включително обриви при бебета, причинени от пелени), прурито нодуларис, себореен дерматит и реакции, причинени от ухапване от насекоми.

Eumovate™ може да се използва като поддържащо лечение между курсовете с някои по-активно действащи кортикостероиди за локално приложение.

**Какво трябва да имате предвид преди приложение**

**Ако отговорите с "да" на някои от следните въпроси, уведомете лекаря за това, преди да започнете приложение на лекарството:**

- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Казвали ли са ви някога, че сте алергични (проявявате повишена чувствителност) към Eumovate™, clobetasone butyrate, или друга съставка на продукта?
- Страдате ли от акне, заболяване наричано розацея (силно зачервяване на кожата



около и върху носа) или периорален дерматит (червени точковидни обриви около устата)?

- Поразеният участък от кожата трябва ли да се покрива с превръзка или се намира под пелените при бебета?
- Уведомете лекаря, в случай че страдате от кожно заболяване, причинени от херпес симплекс вирус, варицела, импетиго, трихофития, кандидоза. В тези случаи не трябва да се прилага Eumovate™.

**Съобщете на лекаря за всички други лекарства които приемате, дори за тези, които сте си купили сами, без лекарско предписание.**

**Не трябва:**

- Да прилагате Eumovate™ за продължителен период от време върху лицето, където кожата лесно изтънява. Ако вашият лекар ви е предписал това лекарство за приложение върху кожата на лицето да се внимава лекарството да не попадне в очите.
- Да прилагате Eumovate™ под превръзка или под пелените при бебета, тъй като това улеснява преминаването на продукта през кожата
- Да прилагате Eumovate™ при деца повече от една седмица.

**Причинява ли Eumovate™ нежелани лекарствени реакции**

Когато се използва правилното количество за предписания период от време Eumovate™ не причинява проблеми при повечето хора.

Ако почувствате подуване на клепачите, лицето или устните, **СПРЕТЕ** веднага употребата на лекарството и се консултирайте незабавно с вашия лекар, тъй като това може да е алергична реакция.

Приложението на големи количества от лекарството върху обширни участъци от кожата и за дълъг период от време може да доведе до временно потискане функцията на надбъбречните жлези, независимо от слабата системна активност на продукта.

При повишена влажност на кожата се увеличава резорбцията на clobetasone butyrate и може да се появи изтъняване на кожата, но само след продължително приложение.

Рядко при приложение на продукта за лечение на псориазис, заболяването може да се влоши като се развие т. нар. пустулозен псориазис. Използването на продукта при псориазис налага редовно лекарско наблюдение.

Много рядко могат да се появят пигментни промени по кожата и повишено окосмяване (хипертрихоза) на мястото на приложение.

**Информирайте своя лекар, ако забележите други нежелани реакции, които не разбирате или не са споменати в тази листовка.**

**Как да прилагате Eumovate™**

- Eumovate™ е само за външно приложение върху кожата.
- Прилагайте Eumovate™ пестеливо само върху засегнатите кожни участъци до четири пъти дневно, а след настъпване на подобрение по-рядко.
- НЕ прилагайте по-голямо от предписаното количество.
- НЕ нанасяйте Eumovate™ върху обширни участъци от кожата за дълъг период от време

Използвайте Eumovate™ така, както лекарят ви е предписал. Ако не сте сигурни в нещо посъветвайте се със своя лекар.



**Какво да направите в случай, че приложите повече от предписаното**

Важно е да следвате указанията на лекаря. Ако по погрешка нанесете повече от предписаното количество, не се безпокойте.

**Какво да направите в случай, че пропуснете да приложите лекарството**

Ако сте забравили да приложите някоя доза, приложете лекарството веднага, след като си спомните или ако е приближило времето за следващата доза, изчакайте времето за приложението ѝ и продължете, както преди това. Не прилагайте двойно по-голямо количество, за да наваксате пропуснатата доза!

**Как се съхранява лекарството**

Съхранявайте Eumovate™, както и всяко друго лекарство, на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте Eumovate™ при температура под 25°C.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, обозначена върху опаковката.

**Запомнете!**

*Това лекарство е единствено за вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите или подобни на вашите.*

*Тази листовка не ви дава пълна информация за лекарството.*

*Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте лекуващия ви лекар.*

*Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте докато употребявате лекарството.*

Дата на последна редакция:

2003 г.

