

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: ..... / ..... , 18.12.04	
Одобрено: ..... 21.26.06.07	

**TENORMIN TABLETS**  
**ТЕНОРМИН ТАБЛЕТКИ**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА**

**Tenormin 50mg Tablets**  
**Atenolol**

**КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ТЕНОРМИН?**

Моля, прочетете тази листовка внимателно преди да вземете таблетките си.. Тя дава само най-важното от достъпната информация за Вашите таблетки.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.

**КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО?**

Името на Вашето лекарство е **Tenormin 50mg Tablets**. Активната съставка на Тенормин таблетките е атенолол.

Тенормин таблетки съдържат 50 mg атенолол.

Вашите таблетки съдържат редица неактивни съставки: царевично нишесте, тежък магнезиев карбонат, желатин, натриев лаурил сулфат, магнезиев стеарат, пречистена вода, хипромелоза, глицерол, титаниев диоксид.

**Tenormin 50mg Tablets** се доставя в опаковки по 28 таблетки.

Атенолол принадлежи към групата лекарства, наречени бета-блокери. Това значи, че той въздейства върху вашето сърце и кръвообращение.

**КОЙ Е ПРОИЗВЕЛ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО?**

Притежател на разрешението за употреба:

**AstraZeneca UK Ltd, 600 Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3LU, UK**

Вашето лекарство е произведено от

**AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, SK10 2NA, UK;**

**AstraZeneca GmbH, Otto Hahn Strasse 68723, Plankstadt, Germany.**

**ЗА КАКВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО?**



Тенормин се използва за лечение на повишено кръвно налягане и някои аритмии (разстройства на сърдечния ритъм). Тенормин може да помогне за предотвратяването на ангина пекторис /гръден жаба/. Тенормин може също така да се използва за защита на сърцето при ранното лечение на миокарден инфаркт.

## **ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ТАБЛЕТКИ**

Моля, говорете с лекаря си преди да започнете приема на Вашите таблетки ако имате някое от следните:

## **КОГА ТЕНОРМИН НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА?**

- Някога сте имали алергична реакция към Тенормин или атенолол
- Някога сте имали алергична реакция към някое от помощните вещества в таблетката.
- имате или някога сте имали някакви сърдечни проблеми, включително декомпенсирана сърдечна недостатъчност или сърдечен блок втора или трета степен , много бавен или много непостоянен сърдечен ритъм, много ниско кръвно налягане или лошо кръвообъщение
- някога са ви казвали, че имате феохромоцитом (високо кръвно налягане причинено от тумор, най-често близо до бъбреците ), който не е бил лекуван. Ако Вие сте лекувани от феохромоцитом лекарят ще ви даде друго лекарство наречено алфа-блокер, което да приемате заедно с Тенормин.
- Казвано ви е че имате имате метаболитна ацидоза (абнормни нива на киселини в кръвта ви)

## **КОГА Е НУЖНО ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ПРИЕМА НА ТЕНОРМИН**

- Вие имате астма или алергични реакции, напр. към ужилвания от насекоми. Ако сте имали астма или хрипове, не трябва да взимате тези таблетки без да дискутирате тези симптоми с лекаря, който пръв ви изписва таблетките.
- Ако страдате от алергични реакции, докато приемате лекарството си като уртикария, оток на кожата и оток около устата то се нуждаете от спешен медицински преглед.
- Някога са Ви казвали, че страдате от специфични болки в гърдите /ангина/, наричана ангина на Принцметал.



- Имате лошо кръвообращение, компенсирана сърдечна недостатъчност или сърдечен блок първа степен.
- Ако сте диабетик, Тенормин може да промени вашата обичайна реакция при понижаване на кръвната захар, която обикновено се изразява в учестяване на сърдечния ритъм.
- Имате тиреотоксикоза (състояние причинено от свръхактивност на щитовидната жлеза). Тенормин може да прикрие симптомите на тиреотоксикоза.
- Имате проблеми с бъбреците. Ако имате проблеми с бъбреците може да се нуждаете от няколко контролни прегледа по време на лечението.
- Ако сте бременна или кърмите.
- Ако сте в напреднала възраст, особено ако имате проблеми с бъбреците
- Вземате някакви други лекарства. Тенормин може да повлияе начина на действие на някои лекарства, а други лекарства може да повлият ефекта на Тенормин.

Следните лекарства могат да причинят проблеми ако се приемат едновременно с Тенормин:

- Клонидин (за високо кръвно налягане или за мигрена). Ако го приемате едновременно с Тенормин не спирайте да взимате клонидин, без да се консултирате с Вашия лекар. Ако е необходимо да спрете клонидин Вашият лекар ще ви даде точни инструкции как да го направите.
- Верапамил, дилтиазем, нифедипин (лекарства за високо кръвно налягане или гръденя жаба)
- Дизопирамид или хинидин (за неритмичен пулс)
- Дигоксин (за сърдечна недостатъчност)
- Адреналин (сърдечен стимулант)
- Ибупрофен и индометацин (за болка и възпаление)
- Инсулин и перорални противодиабетни лекарства (за диабет)
- Назални деконгестанти или други лекарства срещу настинка (включително тези, които си купувате без рецепт в аптеката)

Ако вземате някакви други лекарства, включително такива, които сте си купили сами от аптеката информирайте лекаря си.

Може да забележите забавяне на пулса ви, когато взимате таблетките. Това е нормално, но ако сте обезпокоени, моля свържете се с лекаря си.



Ако постъпите в болница уведомете медицинския персонал и най-вече аnestезиолога , че вземате Тенормин.

Малка е вероятността вашите таблетки да повлият на способността Ви да шофирате или да работите с машини. Въпреки това при някои пациенти може да се появи висене на свят или умора докато вземат Тенормин и, ако тези симптоми са налице, не трябва да шофирате или да работите с машини.

### **КАК ТРЯБВА ДА ВЗЕМАМ ТЕНОРМИН?**

Гълтнете таблетките Тенормин с чаша вода. Лекуващият Ви лекар ще реши каква дневна доза Тенормин да вземате в зависимост от състоянието Ви. Също така прочетете етикета на опаковката. Вашият фармацевт ще ви помогне ако не сте сигурни.

#### **Обичайни дози при възрастни**

Високо кръвно налягане	50 mg до 100 mg
Болки в гърдите /гръден жаба/	100 mg веднъж дневно или 50 mg два пъти дневно
Неритмична сърдечна дейност	50 mg до 100 mg дневно
Ранно лечение на миокарден инфаркт	50 mg до 100 mg дневно

**Ако сте взели повече таблетки от колкото е трябвало** Ако случайно вземете повече от обичайната доза, свържете се с лекуващия лекар или с най-близката болница. Винаги носете с Вас останали таблетки, както и опаковки, така че медицинският персонал да знае точно какво сте взимали.

#### **Ако сте забравили да си вземете дозата**

Ако пропуснете доза, вземете я веднага щом си спомните. Не вземайте две дози едновременно. Ако сте обепокоени попитайте лекаря или фармацевта си за съвет.

#### **Ако сте спрели приема на таблетките**

Не преустановявайте приема на таблетките, без да сте говорили с лекаря си. В някои случаи може да се наложи да ги спирате постепенно.

### **КАКВИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ МОЖЕ ДА ПОЧУВСТВАТЕ С ТЕНОРМИН?**



Както при всички лекарства, понякога може да се появят нежелани ефекти, докато приемате Тенормин. Понякога малък брой хора могат да изпитат следното.:

Студени ръце и крака, умора, забавяне на сърдечния ритъм, главоболие, сухота в устата, гадене, диария, смущения в съня, изтъняване на косата, промяна на настроението, объркане, психози или халюцинации, по-лесно получаване на кръвонасядания или пурпурни белези по кожата, изтръпване на ръцете, сухота в очите, смущения в зрението, кожни обриви, световъртеж (особено при изправяне), импотенция или много рядко жълтеница (жълто оцветяване на кожата и бялото на очите Ви). Някои хора също така страдат от изтръпване или спазми в пръстите на ръцете (феномен на Рейно) и сърден блок (който може да предизвика замаяност или загуба на съзнанието).

Ако Вие страдате от някое от следните състояния, те могат да се влошат след като започнете да приемате Тенормин.

- Псориазис
- Задух или отоци по глезените, ако имате сърдечна недостатъчност
- Астма или дихателни проблеми
- Лошо кръвообращение

Не се тревожете от този списък на възможни реакции. Вие може да не изпитате никое от тях.

Информирайте лекуващия си лекар или фармацевта, ако считате, че имате някакви други проблеми с Вашите таблетки.

### **КАК ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМ МОЯ ТЕНОРМИН?**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка. Съхранявайте блистерите в картонената кутия.

Не употребявайте таблетките след изтичане на срока на годност, обозначен върху опаковката.

Пазете Вашите таблетки на сигурно място, където децата не могат да ги видят или да ги стигнат. Таблетките може да им навредят.

Ако лекарят реши да прекрати лечението Ви, изхвърлете таблетките по подходящ начин. Запазете ги само ако лекарят ви каже така.

### **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**



Тази листовка не съдържа цялата налична информация за Теномин. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.

Тези таблетки са предписани лично на Вас. Никога не ги давайте на други. Те могат да им навредят дори ако симптомите им са същите като вашите.

Тази информация се отнася само за Теномин.

Листовката е изготвена: юни 2003

CV.000-177-392

© AstraZeneca 2001-2006

Tenormin е търговска марка, собственост на AstraZeneca group of companies

