

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ХИПОДЕХИДРА 25 mg таблетки
HYPODEHYDRA 25 mg tablets

Прочетете тази листовка внимателно, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Пазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате други въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и вие не трябва да го претостъпвате на други. То може да им навреди, дори когато симптомите им са същите като вашите.
- Ако някои от страничните ефекти стане сериозна, или се появи друга, която не е описана в тази листовка, моля кажете на Вашия лекар или фармацевт.

Запомнете – това лекарство е изписано само на Вас

В тази листовка:

1. Какво представлява ХипоДехидра и за какво се използва
2. Преди да използвате ХипоДехидра
3. Как да използвате ХипоДехидра
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на ХипоДехидра
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: <u>11-1160</u> / <u>05.12.07г.</u>
Одобрено: <u>6/09.10.07</u>

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХИПОДЕХИДРА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ХипоДехидра е диуретик, който повишава количеството на отделената урина и помага на вашето тяло да отдели излишните течности. ХипоДехидра Ви е изписана, за да се лекува високо кръвно налягане (хипертония). Това лекарство също повлиява отоците и се използва при лечение на хронична сърдечна недостатъчност. ХипоДехидра може да се използва и при състояние, известно като „безвкусен диабет”, както и за предотвратяване образуването на калциеви конкременти в бъбреците.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХИПОДЕХИДРА

Не приемайте ХипоДехидра ако:

- сте свръхчувствителни към хидрохлоротиазид или някое друго вещество, което влиза в състава на таблетките
- сте алергични към лекарствено вещество, което принадлежи към сулфонамидите
- имате сериозно чернодробно или бъбречно заболяване (неспособност за уриниране или отделяне на малко количество урина)
- имате нарушен електролитен баланс (променено съдържание на калиевите, натриевите и калциевите йони в организма Ви)
- ако страдате от подагра

Обърнете специално внимание при лечението с ХипоДехидра:

- преди да започнете да взимате това лекарство, кажете на Вашия лекар или фармацевт всички лекарства, които сте приемали, както и ако страдате от някакво заболяване;
- ХипоДехидра може да понижи серумните нива на калий, затова ще е необходимо добавянето на калий в диетата, който ще ви бъде изписан от Вашия лекар;
- ако сте диабетно болен, ХипоДехидра може да повлияе контрола върху серумните нива на глюкоза, затова състоянието Ви трябва да се следи;



- ХипоДехидра може да увеличи серумните нива на холестерол и триглицериди, както и да се влоши състоянието на пациенти, страдащи от подагра;
- ХипоДехидра може да ви направи по-чувствителни към слънцето. Поради тази причина трябва да избягвате директното излагане на слънце, както и да използвате слънце-защитни средства;
- ХипоДехидра може да влоши лупус еритематоза;
- може да причини ортостатичен колапс (виене на свят при рязко изправяне на тялото);
- ако ви предстои операция, кажете на Вашия лекар или зъболекар, че приемате това лекарство.

Прием на други лекарства и храни:

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Някои лекарства могат да взаимодействат с ХипоДехидра. Кажете на Вашия лекар ако приемате някое от следващите изброени лекарства: холестирамин; колестипол; карбеноксолон; кортикостероиди (напр. преднизолон); калциеви соли; антихолинергични средства (атропин, биперидин); диазоксид; дигоксин; метилдопа; литий; нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства (аспирин, диклофенак, индометацин); разхлабителни и антидиабетни средства.

Кажете на Вашия лекар, ако приемате витамин D, амантадин, алопуринол, циклоспорин, циклофосфамид или метотрексат.

ХипоДехидра може да се приема със или без храна. Не приемайте алкохол по време на терапията с ХипоДехидра.

Бременност и кърмене:

ХипоДехидра не трябва да се приема по време на бременност, освен изрична необходимост.

Хидрохлоротиазид преминава в кърмата. Консултирайте се с Вашият лекар преди да започнете да използвате каквото и да е лекарство по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини:

По време на първите дни от лечението, вашите реакции може да бъдат забавени. Не шофирайте и не работете с машини, докато ефектът на хидрохлоротиазид върху Вашите реакции не бъде точно определен.

Информация за спортисти:

ХипоДехидра може да повлияе резултатите от някои тестове.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХИПОДЕХИДРА

Винаги приемайте хидрохлоротиазид така, както е казал Вашият лекар.

Поддържащата доза е ½ - 1 таблетка, приета сутрин, но обикновено при *хипертония* (високо кръвно налягане) лечението започва с начална доза от 1 - 2 таблетки, приети еднократно сутрин или разделени в два приема.

При *сърдечна недостатъчност и оток*, първоначалната доза е 1 - 3 таблетки, разделени в 1 - 2 приема.

При *безвкусен (незахарен) диабет* първоначалната доза е 4 таблетки, разделени в 2 - 4 дози. По-късно дозата може да се намали.

При *повишено ниво на калций в урината* (хиперкалциурия) и профилактика на *нефролитиаза* (образуване на камъни в бъбреците) се приемат по 1 - 2 таблетки дневно.

По време на лечението с ХипоДехидра трябва да приемате храни, богати на калий (плодове и зеленчуци).

Приемайте таблетките редовно, по едно и също време на деня. Важно е да приемате таблетките, дори и ако се чувствате добре. Не прекратявайте лечението, без да се консултирате с лекар преди това.



Ако сте пропуснали да приемете ХипоДехидра

Ако сте пропуснали прием, вземете таблетката колкото е възможно по-скоро. Ако приближава времето за следващия ви прием, не взимайте двойна доза. **НЕ** приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате други въпроси, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Предозиране

В случай, че вземете повече таблетки или дете погълне таблетки, **ВЕДНАГА** се свържете с лекар. Симптомите на предозиране включват слабост, намаляване на количеството отделена урина, затруднено дишане.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ХипоДехидра може да предизвика някои нежелани лекарствени реакции, но не всеки ги получава.

Най-честите странични ефекти са: електролитен дисбаланс (понижени нива на калиеви, натриеви, калциеви йони).

По-рядко – стомашна болка, анорексия, понижена сексуална функция, диария, хипергликемия, спадане на кръвното налягане при рязко изправяне на тялото (ортостатична хипотония), фоточувствителност.

Рядко панкреатит (възпаление на задстомашната жлеза), агранулоцитоза, алергичен дерматит, алергични реакции, възпаление на жлъчката, чернодробно заболяване, подагра, жълтеница, кожни обриви, системен лупус еритематозус, уртикария, тромбоцитопения.

Ако някой от тези нежелани ефекти стане сериозен или се появи друг, който не е описан в тази листовка, кажете на Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ХИПОДЕХИДРА

Няма специални условия на съхранение.

Да не се приема след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Да се съхранява на място недостъпно за деца

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Състав на таблетките:

Активната съставка е Hydrochlorothiazide (хидрохлоротиазид).

Освен нея, в таблетките се съдържат: манитол, калциевхидроген фосфат безводен, царевично нишесте, нишесте, прежелатинизирано, повидон, магнезиев стеарат.

Как изглежда ХипоДехидра таблетки:

Овални, двойно изпъкнали бели таблетки с делителна линия от едната страна.

Картонената кутия съдържа листовка за пациента и 3 блистера. Всеки блистер съдържа 10 таблетки.

Дата на последна редакция на текста

Октомври 2007



Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
гр. Варна 9000, “Н.Й.Вапцаров” № 1, България

Име и адрес на производителя
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
гр. Пловдив 4000, бул. “Санкт Петербург” № 53, България

