

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

### MUKOSEPTONEX® E капки за нос, разтвор

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Информирайте Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошават или не се подобряват след 3-дневно приложение.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### В ТАЗИ ЛИСТОВКА

1. Какво представлява Мукосептонекс Е и за какво се използва
2. Преди да използвате Мукосептонекс Е
3. Как да използвате Мукосептонекс Е
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Мукосептонекс Е
6. Допълнителна информация

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>	
Макет на опаковката - Приложение 3	
Към РУ №:	11-1447, 22.01.08
Одобрено:	8 / 20.11.07

**ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**  
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Ostravska 29, 747 70 Opava – Komarov, Czech Republic

#### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МУКОСЕПТОНЕКС Е И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Мукосетнонекс Е са капки за нос и се използва за лечение на остри възпаления на лигавицата на носа и особено в случаите, когато е необходимо бързо възстановяване на носната проходимост.

Мукосетнонекс Е принадлежи към група лекарствени продукти наречена оториноларингологични средства. Мукосетнонекс Е потиска набъбването и отока на носната лигавица и я дезинфектира.

Капките за нос, съдържащи локално действащи антисептици в определена концентрация са удобни за по-продължително приложение с цел дезинфекция на лигавицата на горните дихателни пътища. В комбинация с ефедрин деконгестивният ефект на Мукосетнонекс Е е терапевтично изразен.

#### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЛОЖИТЕ МУКОСЕПТОНЕКС Е

**Не прилагайте Мукосептонекс Е:**

- Ако сте свръхчувствителен към активните съставки или някое от помощните вещества;
- При деца под 1 година.



### **Обърнете специално внимание при употребата на Мукосептонекс Е:**

- ко не се наблюдава облекчаване на симптомите в рамките на 3 дни или състоянието Ви се влошава, ако наблюдавате някакви необичайни реакции, моля свържете се с Вашия лекар.
- Консултирайте се с Вашия лекар дали можете да използвате тези капки за нос в случай на некомпенсирана хипертония, хипертиреоза, сърдечна недостатъчност и скорошен сърдечен инфаркт.

### **Прием на други лекарства**

Консултирайте се с Вашия лекар относно едновременното приложение на Мукосептонекс Е с други лекарствени продукти. Ако Вашия лекар Ви предпише други лекарства, информирайте го, че използвате Мукосептонекс Е.

### **Бременност и кърмене**

Приложението на Мукосептонекс Е време на бременност и кърмене не е противопоказано, ако терапевтичният ефект надвишава потенциалния риск.

### **Шофиране и работа с машини**

Мукосептонекс Е не оказва влияние върху дейности, изискващи повишено внимание (шофиране на моторни превозни средства, работа с машини и работа на високи места).

## **3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ МУКОСЕПТОНЕКС Е**

### **Дозировка и начин на приложение**

Ако не е назначена от лекаря друга доза, обикновено дозата при възрастни е 2-3 капки 5 пъти дневно, а деца над 1 година - 1-3 капки 3 пъти дневно във всяка ноздра. При деца интервалът между отделните дози трябва да е най-малко 5 часа. Приложението на Мукосептонекс Е не трябва да да бъде по-дълго от 10 дни при възрастни, и 3 дни при деца.

### **Ако сте приложили по-голямо количество Мукосептонекс Е отколкото трябва**

Ако Вие (или някой друг) сте приложили по-голямо количество от лекарствения продукт, отколкото е необходимо, или ако мислите, че дете е погълнало някакво количество от лекарството, моля консултирайте се незабавно с Вашия лекар или фармацевт.

### **Ако сте пропуснали да приложите Мукосептонекс Е**

Ако забравите да приложите дозата в определеното време, приложете я възможно най-скоро след като си спомните и след това продължете с приложението в обичайните интервали, като никога не комбинирайте две дози.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате някакви въпроси относно употребата на Мукосептонекс Е капки за нос.

## **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Рядко може да се наблюдават кожни реакции след приложение при свръхчувствителни пациенти. Честата и продължителна употреба на Мукосептонекс Е може да предизвика изразен оток на носната лигавица скоро след приложението.

### **Респираторни, торакални и медиастинални нарушения**

Оток на носната лигавица (след честа и продължителна употреба).

### **Нарушения на кожата и подкожните тъкани**

Обрив (след приложение при свръхчувствителни пациенти).



При евентуална поява на друге нежелане или необичайни реакции, посъветвайте се с Вашия лекар относно по-нататъшното приложение на Мукосептонекс Е.

## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МУКОСЕПТОНЕКС Е**

Да се съхранява на сухо и тъмно място при температура под 25°C. Да се пази от замръзване.

Да се съхранява на място недостъпно за погледа и досега на деца.

Не използвайте Мукосептонекс Е след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, след означението "Годен до:" Означението "Годен до:" отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Какво съдържа Мукосептонекс Е:**

- Активните съставки са карбетопендицин бромид 5,5 mg и ефедрин хидрохлорид 100 mg в 10 ml капки за нос, разтвор.
- Другите съставки са: динатриев едетат дихидрат, динатриев хидрогенфосфат додекахидрат, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, повидон 25, пречистена вода.

**Какво съдържа опаковката**

Стъклен флакон от 10 ml.

**Дата на последно одобрение на листовката**

