

**ВОБЕ-МУГОС Е (WOBE-MUGOS E)**  
**Стомашно-устойчиви филм-таблетки**

**Състав на една таблетка**

Papain 100 mg (съответстващ на 270 F.I.P.U.), trypsin 40 mg (съответстващ на 29  $\mu$ kat), chymotrypsin 40 mg (съответстващ на 200  $\mu$ kat). Обща протеолитична активност - 1740 F.I.P.U.

**Показания**

Протективно средство срещу усложнения (странични ефекти) при лъчетерапия на тумори на глава-  
шия.

**Дозировка и начин на приложение**

Три до пет дни преди и по време на лъчетерапия - 3 пъти дневно по 2 таблетки, при наличие на метастази - 3 пъти дневно по 4 таблетки. В зависимост от индивидуалното състояние и съществуващата терапия могат да се приемат и по-високи дози (4 пъти дневно по 5 таблетки).

Препоръчва се таблетките да се приемат веднъж дневно или да се разпределят в няколко приема между храненията с голямо количество вода.

**Противопоказания**

Тежки вродени или придобити нарушения на кръвосъсирването (напр. хемофилия), чернодробни или бъбречни увреждания, хирургични интервенции и данни за склонност към алергични реакции са индикации за провеждане на лечението с повишено внимание.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕСЛАВИЕ

Приложение към  
разрешение за употреба №

616/18.12.01

*Лалеев*

**Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба**

Няма.

**Лекарствени и други взаимодействия**

Не са известни.

**Бременност и кърмене**

Приложението на препарата по време на бременност трябва да става след преценка на съотношението очаквана полза/вероятен рисък, независимо, че при проведените клинични проучвания за ембриотоксичност при животни не са отчетени промени.

Употреба по време на кърмене: Няма данни, изключващи преминаването на лекарството в кърмата.

**Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма данни.

**Нежелани лекарствени реакции**

При приемане на по-високи еднократни дози Вобе-Мугос Е са забелязани прояви на чувство на пълнота в стомаха, подуване и газове, а в отделни случаи и гадене. В такива случаи е необходимо разделяне на дневната доза на няколко приема. Рядко се наблюдават алергични реакции, които напълно изчезват след преустановяване на приема. В резултат на ензимното действие биха могли да се наблюдават безвредни промени във фекалиите по отношение на консистенция, цвят, мирис.

**Предозиране**

Дори при дълготрайно лечение или прием на високи дози, не са установени симптоми на интоксикация при хора. Много рядко може да се появи лекостепенна диария, която отзува се след преустановяване на приема, без да е необходимо предприемане на други терапевтични мерки.

**Срок на годност**

3 години.

**Специални условия за съхранение**

Не са необходими.

**Данни за опаковката**

Опаковка x 20, x 40, x 100 стомашно-устойчиви филм-таблетки.

**Препоръки при употреба**

За диабетици: Съдържанието на въглехидрати в 1 таблетка отговаря на 0,02 хлебни единици.

**Име и адрес на производителя**

Mucos Pharma GmbH & Co., Malvenweg 2, 82538 Gertsried, Germany, <http://www.mucos.de>

**Носител на решението за регистрация**

Mucos Pharma CZ, Ltd., Průhonice 25243, Průhonice 25243, Praha, Česká republika

**Дата на последната редакция**

Февруари 2002.