



ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ФОРЛАКС
FORLAX

Състав за едно саше:

Macrogol(INN)* 4000.....10g

Макрогол (INN)* 4000.....10g

Помощни вещества

Захарин натрий.....0,017g

Портокалов грейпфрутов аромат.....0,150g

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за перорален разтвор

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

10 g прах за перорален разтвор в сашета
кутии с 10 и 20 сашета

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ:

ОСМОТИЧЕН ЛАКСАТИВ

Слабително средство с осмотично действие
(А: Храносмилателна система и метаболизъм)

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Beaufour Ipsen International
37 rue Spontini
75116 paris, France

КОЙ ПРОИЗВЕЖДА ТОВА ЛЕКАРСТВО

Beaufour Ipsen Industrie
rue Ethe Virton
28100 Dreux, France

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Това лекарство се препоръчва за симптоматичното лечение на
запек при възрастни.

Лекарствената форма не се прилага в детската възраст.



КОГА НЕ БИВА ДА ВЗИМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО

Това лекарство НЕ ТРЯБВА да се използва в следните случаи:

- някои заболявания на тънките черва и на дебелото черво
- в случаи на коремна болка(стомашна болка)

ПРИ СЪМНЕНИЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ
ЗА СЪВЕТ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДА НЕ СЕ ПРИЕМА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ БЕЗ
МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА КАКВО СЕ ВЗЕМА ТОВА ЛЕКАРСТВО

Нередовен запек

Той може да се дължи на скорошна промяна в начина на живот (пътуване). Лекарството може да помогне при краткотрайно лечение. Всеки скорошен запек, който не се дължи на промяната в начина на живот, или всеки запек придружен от болка, температура, стомашно кървене са причина да се потърси съвет от лекар.

Хроничен запек (продължителен запек)

Той се свързва с две причини:

- или е резултат от чревно заболяване, което се нуждае от медицинско наблюдение,
- или е резултат от нарушен баланс в стомашно чревните функции като следствие от хранителни навици и начин на живот.
- **Лечението трябва да включва още:**
- увеличено приемане на продукти от растителен произход (пресни зеленчуци, сурови зеленчуци, пълноценен хляб, плодове...)
- повишено приемане на вода и плодови сокове
- повишена физическа активност (спортуване, ходене...)
- трениране на рефлекс за дефекацията
- понякога, добавяне на трици към хранителния режим

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Това лекарство съдържа полиетиленгликол. Много редки случаи на алергична реакция (уртикария, обрив, едем) са наблюдавани при лекарства съдържащи полиетиленгликол.

*В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОТЪРСЕТЕ
СЪВЕТ ОТ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.*



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

*ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ НЕЖЕЛАНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ДРУГО ЛЕКАРСТВО, УВЕДОМЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ
ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЯКО ПРИДРУЖАВАЩО ЛЕЧЕНИЕ.*

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Това лекарство не бива да се използва по време на бременност, освен по препоръка на вашия лекар.

Това лекарство може да се използва по време на кърмене.

*КАТО ОБЩО ПРАВИЛО АКО СТЕ БРЕМЕННА ИЛИ КЪРМИТЕ
ВИЕ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ ЗА СЪВЕТ КЪМ
ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА
ВЗИМАТЕ КОЕТО И ДА Е ЛЕКАРСТВО.*

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ В ПРЕДВИД БЕЗОПАСНАТА УПОТРЕБА ПРИ НЯКОИ ПАЦИЕНТИ

Захарин Натрий

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТ

ДОЗИРОВКА

САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ

1 до 2 сашета на ден, за предпочитане приети заедно като единична доза сутрин.

НАЧИН ИЛИ ПЪТ НА ПРИЕМАНЕ

Перорално

Всяко пакетче трябва да се разтвори в чаша вода.

Ефектът се проявява от 24 до 48 часа след приема.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

КАТО ВСЕКИ АКТИВЕН ПРОДУКТ, ТОВА ЛЕКАРСТВО
МОЖЕ ПРИ НЯКОИ ПАЦИЕНТИ ДА ИНДУЦИРА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВОДЕЩО ДО ПО ГОЛЯМА ИЛИ ПО МАЛКА
СТЕПЕН НА НЕУДОБСТВО.

- Диария
- Коремни болки
- В много редки случаи , алергични реакции като обрив, уртикария и едем.



УВЕДОМТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСЯКО
НЕЖЕЛАНО И НЕПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НЕСПОМЕНАТО
В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

СЪХРАНЕНИЕ

НЕ ПРОСРОЧВАЙТЕ СРОКА НА ГОДНОСТ ЯСНО
ПОСОЧЕН НА ОПАКОВКАТА.

ДАТА НА ПОСЛЕДНО ПРЕРАБОТВАНЕ НА ЛИСТОВКА

Март 2002г.

