

**HERPESIN 5% крем
(ХЕРПЕЗИН 5% крем)
aciclovirum**

ПРОИЗВОДИТЕЛ
Lachema a. s., Brno, Чехия

СЪСТАВ

Активна съставка: 5% ацикловир

Основа на крема: хидрофилна основа със съдържание на methylparabene и propylparabene

ЛЕКАРСТВЕНА ГРУПА

Ацикловир е вещества, което помага размножаването на herpes simplex (I и II) и Varicella zoster вирусите в човешкия организъм. След проникване в инфицираната от вирус клетка, ацикловир се трансформира в активно стъединение ацикловир трили фосфат.

ПОКАЗАНИЯ

Кремът се използва за лечение на първични и рецидивиращи херпесни инфекции - herpes simplex facialis, labialis, progenitalis.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Херпесин 5% крем не трябва да се употребява при сърхувствителни към ацикловир или помощният вещества на препарата, болни.

Временни или кърмещи жени могат да използват препарата по лекарско предписание само при наличие на сериозни проблеми.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Веднага след прилагането на крема може да се почувства леко парене, което по правило отзвучава. По изкачение може да се наблюдават прояви на засиряване, сърбен, умерено изстъхване и/или излющване на кожата.

При появя на нежелана лекарствена реакция или друг спрямшен ефект, трябва да се обърнете към лекар.

ВЗАЙМОДЕЙСТВИЯ

Не са известни досега взаимодействия между ацикловир, приложен под форма на крем, с други вещества.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Възрастни / деца

С оглед постигане на оптимален терапевтичен ефект е необходимо да се започне с лечение още след появя на първични симптоми, т.е. чувство на напрежение в стомашното място, парене, последвано от появя на херпесна ерупция. Не се колебайте да намажете с малки количества Херпезин крем засънатите участъци на кожата, пети пъти дневно на всеки четвърти часа (без ноща апликация). Нормално ефектът от лечението се проявява много бързо, но все пак това продължава с използването на крема най-малко три дни след отзвучаване на херпесната инфекция. В случаи, че заболяването продължава дори след десетдневен курс на лечение трябва да се обърнете към лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Херпесин 5% крем е предназначен само за външна употреба - за лечение на херпес на устните или други части на лицето, с изкачение на конкремтивата на очите. При попадане на крема в очите, използвайте оши Kanki или хладка вода за промиване. При персистиране на оплакванията попърсете медицинска помощ.

Кремът не е предназначен за лечение на устната кухина. При попадане на крема в устната е наличен риск от раздразняване на лизингата, но все пак това не е необходимо да се прилага лечение.

Не превишавайте предписаната дозировка. В случаи, че херпесната инфекция засяга по-задени участници, лекарят ще определи най-доброто лечение.

Херпесното заболяване е заразително, като по тази причина трябва да избегвате директен контакт на засегнатия участник с други хора (напр. целувка) или с нещи (кърпи и др.). Докато не си измите ръцете, не докосвайте други части на тялото, и по специално очите.

При покъщдане на края от деца, се обрнете към лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

Препараторът Херпесин 5% крем трябва да се съхранява на сухо място при температурата до 25° C.

ОПАКОВКА

Туби от 2g и 5g.

СРОК НА ГОДНОСТ

24 месеца