

Какво трябва да знаете за Lifurox (Лифурокс (cefuroxime sodium))

Моля, прочетете тази листовка внимателно. Тя не съдържа цялата информация, която може би трябва да знаете, затова се обърнете към Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт ако имате някакви въпроси. Тази листовка се отнася само за инжекционния Лифурокс.

Какво съдържа Вашето лекарство

Вашето лекарство се нарича Лифурокс. Неговата активна съставка е cefuroxime sodium (цефуроксим натрий). Вашето лекарство се намира в стъклени шишенца, съдържащи 750 милиграма или 1,5 грама цефуроксим на прах. В болниците Лифурокс се снабдява в опаковки с един флакон. Вашият лекар или медицинска сестра ще разтворят прахчето цефуроксим с "вода за инжектиране" или с друг подходящ разтворител, за да могат след това да го инжектират в мускул или в някоя от Вашите вени.

Лифурокс е антибиотик. Антибиотиците помагат на организма да се справи с инфекциите. Инжекционният Лифурокс действа чрез разрушаване на определени микроорганизми, причинители на инфекция.

Инжекционният Лифурокс се произвежда от Eli Lilly Italia S.p.A.; Via Gramsci, Sesto, Fiorentino, Florence, Italy.

Защо Лифурокс?

Инжекционният Лифурокс се използва за лечение на различни видове инфекции, като:

- Бронхити, пневмонии и други инфекции в областта на гръдния кош
- Инфекции на уши, нос и гърло
- Инфекции на бъбреците и цистити
- Инфекции на кожа, кожни структури, кости и стави
- Възпалителни заболявания в областта на малкия таз
- Септицемия и менингити (Забележка: при менингит се предпочита употребата на антибиотици, които се отнасят към групата на т.нар. цефалоспорини трета генерация) и
- Гонорея

Лекарят може да Ви даде това лекарство преди операция, за да Ви предпази от инфекция.

Преди да използвате Вашето лекарство

Вашият лекар ще се увери първо, че инжекционният Лифурокс е безопасен за Вас.

Ако отговорите с ДА на някой от следващите въпроси, кажете на Вашия лекар или медицинска сестра. Ако не сте сигурни за нещо, моля, обърнете се към тях.

- Имали ли сте някога алергична реакция към антибиотици, като пеницилин или цефалоспорини? (Алергичната реакция може да включва обрив, сърбеж, оток или затруднения в дишането)
- Взимате ли други лекарства, особено диуретици (таблетки за "отводняване"), пробеницид или други антибиотици?
- Бременна ли сте или бихте ли могли да сте?
- Имате ли някакви проблеми с бъбреците или сте на диализа?

Как се използва инжекционният Лифурокс за лечение

Вашият лекар ще реши каква трябва да бъде Вашата доза.

Обичайни дози

1. Възрастни: При повечето пациенти нужната доза е 750 милиграма три или четири пъти дневно, но за по-тежки инфекции тя може да се увеличи до 1,5 грама три или четири пъти дневно. Ако имате проблеми с бъбреците, може да Ви се дава по-малка доза един или два пъти дневно.
 - Вашият лекар може да Ви даде 1,5 грама инжекционен Лифурокс преди операция, за да Ви предпази от инфекция. След операцията Може да Ви се приложат дози от 750 милиграма Лифурокс.
1. Бебета и деца: Обикновено 60 милиграма на всеки килограм от тяхното телесно тегло всеки ден. Тази доза трябва да бъде разделена на три или четири отделни дози.
2. Новородени: Обикновено 30 до 100 милиграма на всеки килограм от тяхното телесно тегло всеки ден. Тази доза трябва да бъде разделена на три до четири отделни дози.
 - Ако Вие или пък дете се лекувате/лекува с Лифурокс за менингит, може би ще бъде необходимо по-голяма доза от лекарството.
 - Вашият лекар или медицинска сестра ще инжектира Лифурокс във мускул или във веа.

Докато се лекувате

- Лифурокс може да причини някои нежелани реакции като алергия, която може да включва обрив или температура. Рядко, може да има по-сериозни реакции, като спадане на кръвното налягане или затруднено дишане.
- Лифурокс може да причини диария, която може да бъде с кръв или слюз. Веднага кажете на Вашия лекар, ако настъпи такова нещо.
- Лабораторните изследвания показват, че Лифурокс предизвиква промени в показателите на кръвта и в показателите за работа на черния дроб и бъбреците (но това е рядко).
- Ако Ви боли, когато Ви инжектират Лифурокс в мускула или във вената, кажете веднага на лекаря или медицинската сестра.
- Ако се появят някои от тези нежелани реакции или някакви други, обърнет е се към Вашия лекар. Той/тя има повече информация за Лифурокс и ще реши какво трябва да се направи.

Как се съхранява Вашето лекарство

- В болничната аптека, шишенцата с Лифурокс на прах трябва да се съхраняват на тъмно място, на стайна температура (под 25 °С) и не трябва да се използват след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
- Когато прахчето Лифурокс се разтвори с разтворител, то трябва да се съхранява в хладилник (2-8°C) до 24 часа.

Запомнете: Това лекарство е само за Вас. То може да се изписва само от лекар. Никога не го давайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите като Вашите.

Дата на изготвяне на листовката: Ноември 1999г.