


Приложение 2

Листовка за пациента





ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

LOMEXIN
ЛОМЕКСИН

INN : FENTICONAZOLE

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

100 g крем съдържат :

fenticonazole nitrate.....2,000 g

Количество, което съответства на 1,757g fenticonazole

Помощни вещества : пропиленгликол, хидрогениран ланолин, сладко бадемово масло, полигликолов естер на мастни киселини, цетилов алкохол, глицерил моностеарат, натриев едетат, пречистена вода.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Крем 2% в туби от 30 g

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ :

Recordati SPA

Milano, Italia

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА !

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ПРЕДИ УПОТРЕБА !

СВОЙСТВА

Lomexin крем притежава фунгистатично и фунгицидно действие върху дерматофити (причиняващи повечето гъбични кожни инфекции), патогенни кvasни гъбички, диморфни гъбички и плесени. В добавка Lomexin крем е активен срещу Грам - положителни бактерии и ето защо е показан при микози, свързани с бактериални суперинфекции. Lomexin крем е активен, както "ин витро", така и "ин vivo" спрямо Трихомонас вагиналис.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- ❖ Дерматомикози, причинени от дерматофити (Tricophyton, Microsporum, Epidermophyton) в различни локализации: кел на главата, кел на тялото, кел на подбедрицата, кел на стъпалото (



ходило на атлети), кел на ръката, на лицето, на брадата, на ноктите.

- ❖ Кожни кандидози (интертриго, перлещ, лицева кандидоза, кандидоза от възпаление от допиращи се пелени, перинеална и скротална кандидоза); баланит, баланопостит, онихия и паронихия.
- ❖ Питириазис верзиколор (причинен от *Pityrosporum orbiculare* и *Pityrosporum ovale*).
- ❖ Отомикози (от *Candida* или квасни гъбички); ако няма спукано тъпанче.
- ❖ Еритразма.
- ❖ Микози с бактериални суперинфекции (причинени от Грам-положителни бактерии).
- ❖ Лечение на инфекции на кожата на главата, причинени от квасен *Pityrosporum* също като себореен дерматит и питириазис на главата.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към някоя от съставките (или чувствителност към имидазоловите производни).

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Избягвайте контакт с очите, а ако това се случи, изплакнете старателно с вода.

Употребата на продукти за локално приложение, особено ако е продължителна, може да доведе до повишаване на чувствителността. В този случай прекъснете лечението и се консултирайте с лекар за започване на подходящо лечение.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Макар че кожната абсорбция на *fenticonazole* е незначителна, не е препоръчителна употребата на лекарствения продукт по време на бременност.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не се съобщава за такива ефекти.



ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ВЪЗМОЖНИ РЕАКЦИИ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, МОЛЯ ИНФОРМИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО И РЕДОВНО ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПРИЕМАТЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, КАКТО И ЗА ВСЕКИ НЕОБИЧАЕН СИМПТОМ, ВЪЗНИКНАЛ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА :

пропиленгликол, хидрогениран ланолин, натриев едетат (E 385)

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Това е медикамент за локално приложение.

Показан е за лечение на неокосмена кожа, на кожните гънки и лигавици; трябва да се втрива нежно. За предпочитане е да се използва при суха микоза : питириазис верзиколор, еритразма, онихомикоза (при онихомикоза кремът се прилага с оклузивна превръзка). Подходящ е за употреба при генитални микози при мъже.

Нанасяйте редовно крема върху възпалените участъци веднъж или два пъти дневно в продължителност, препоръчана от Вашия лекар според микозата.

В случай на кандидози, тоалетът трябва да се осъществява с алкален или рН-неутрален сапун.

Лечението е придружено със спазването на някои съвети за хигиена (носене на памучно бельо, избягване на вагинални промивки) и доколкото е възможно - премахването на благоприятстващите фактори. Да не се прекъсва лечението по време на менструация.

Lomexin не е мазен, не прави лекета и може лесно да се отмие с вода.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Обикновено Lomexin, приложен върху кожата или лигавицата, се понася добре; по изключение се съобщава за леки и преходни еритемни реакции или чувство на парене, които бързо отзвучават.



В случаи на реакции на свръхчувствителност или развитие на резистентни микроорганизми, лечението трябва да се преустанови и да се потърси лекарска помощ.

Lomexin се резорбира незначително в препоръчаните условия за употреба; могат да се изключат системни поражения.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Лекарството трябва да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява на недостъпно за деца място.

СРОК НА ГОДНОСТ : 3 години

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ, ОТБЕЛЯЗАН ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОПАКОВКАТА

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

март 2003

