

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Мисоронт
Мукопронт
сироп

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНТО	
Приложение към разрешение за употреба №	
617/12.02.02	Сълнч

Състав

5 г сироп (1 мерителна лъжиичка) съдържат:

280 mg carbocisteine sodium, равняващ се на 250 mg carbocisteine

Помощи вещества:

Натриев захарин	0.300 г
Метил паракидроксибензоат	0.100 г
70% разтвор на сорбитол	60.000 г
Изкуствена есенция на ликъор от кайсии, Е 14 844	0.200 г
Изкуствена есенция на карамел, 52929/A	0.050 г
Дестилирана вода	30.855 г

Важно за диабетици: 5г сироп съдържат 2.1 г сорбитол (еквивалентно на 0.18 диабетични единици)

Притежател на разрешението за употреба и производител

Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG
a company of the Pfizer group
Heinrich-Mack-Str. 35
D-89257 Illertissen
Germany

Свойства и действие

Mucoront подобрява реологията на бронхиалния секрет чрез качественото му изменение.

Показания

Като допълнително лечение на остри и хронични белодробни заболявания, протичащи с нарушения в образуването и отделянето на секрета.

Противопоказания

Продукта е противопоказан при:

- свръхчувствителност към carbocisteine
- бременност
- кърмене
- новородени и деца до 2 години, тъй като липсва достатъчно опит
- язва на стомаха
- свръхчувствителност към метилпрахидроксибензоат (парабен)

Специални предупреждения и предпазни мерки

Ако е необходимо, дозата да се намали при пациенти, страдали от стомашно-чревни язви. Съдържащият се в Мисоргент сироп метилпрахидроксибензоат може да причини уртикария, рядко бронхоспазъм.

Взаимодействия с други лекарства

До сега не са известни.

Бременност и кърмене

Въпреки, че експериментите с животни, дори и с високи дози не са показвали ембриотоксични ефекти, от съображения за сигурност carbocisteine да не се употребява по време на бременност и кърмене.

Лечение върху способността за шофиране и работа с машини

Не са наблюдавани ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

Начин на приложение и дозировка

Възрастни:

3 мерителни лъжички Mucopront сироп три пъти дневно (3 мерителни лъжички се равняват на 750 mg carbocisteine).

Деца над 2 години с телесно тегло 12-20 кг:

1 мерителна лъжичка Mucopront сироп два пъти дневно (1 мерителна лъжичка се равнява на 250 mg carbocisteine).

Деца над 4 години с телесно тегло над 16 кг:

1 мерителна лъжичка Mucopront сироп три пъти дневно (1 мерителна лъжичка се равнява на 250 mg carbocisteine).

Опаковката съдържа мерителна лъжичка за точно дозиране.

Курса на лечение да не надвишава 10 дни.

Предозиране

Дори при свръхдозиране не са известни случаи на интоксикация.

24-часова ендоскопия не показва интрабронхиална свръхсекреция.

Нежелани лекарствени реакции

Понякога могат да се появят стомашни киселини, гадене, повръщане, диария и главоболие.

Съобщава се за отделни случаи на алергични реакции (сърбеж, уртикария, обрив).

Carbocisteine може да предизвика стоматит и ринит при свръхчувствителни пациенти.

Поради съдържанието на метилпараидроксибензоат (парабен) при предразположени пациенти могат да настъпят реакции на свръхчувствителност.

Указания за съхранение

Mucopront да се съхранява при температура под +25°C (77°F).

Срок на годност

3 години

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Опаковки

Опаковки от 90мл