

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 10.08.05г.



5/13601075/0801

Указания за употреба

B. Braun Melsungen AG · D-34209 Melsungen, Germany

Natrium Chlorid 0,9% Braun Натриев хлорид 0,9 % Браун

Състав

100 ml разтвор съдържат:

Активна съставка

натриев хлорид 0,9 g

Други съставки:

вода за инжекции.

теоретичен осмоларитет 308 mOsm/l

титрационна киселинност < 0,3 mmol/l

pH 4,5 - 7,0

Концентрация на електролити:

Натрий 154 mmol/l

Хлориди 154 mmol/l

Фармацевтична форма

Разтвор за инжекции

- Полиетиленови ампули, съдържание:

10 ml, 20 ml

- Стъклени флакони, съдържание:

100 ml

Фармакотерапевтична група

Разтвор носител.

Показания

Разтворител за приготвяне и разреждане на медикаменти за парентерално приложение.

Противопоказания

Натриев хлорид 0,9% Браун трябва да се прилага с особено внимание при

пациенти с:

- Хипернатриемия;

- Хиперхлоремия.

Внимание при употреба и специални предупреждения

Няма.

Взаимодействия

Трябва да се вземат под внимание възможните несъвместимости при смесване с други медикаменти.

Дозировка

Количеството, което е необходимо зависи от желаната концентрация на лекарственото средство, което ще се разтваря.

При прилагане на разтвора като разтворител/разредител за съвместими електролитни концентрати или медикаменти, трябва да се спазват инструкциите за смесване към съответния медикамент.

Предозиране

Симптоми

Предозирането с 0,9% т/о натриев хлорид може да доведе до хипернатриемия, хиперхлоремия, хиперхидратация, серумен хиперосмоларитет и метаболитна ацидоза.

B|BRAUN



Schwarz

Approval for Printing B BRAUN Melsungen AG	
Approved for Printing	<input type="checkbox"/>
Approved for Printing when corrected	<input type="checkbox"/>
New draft required	<input type="checkbox"/>
Date	Signature





Спешно лечение, антидоти

Незабавно прекратяване на инфузията, прилагане на диуретици с непрекъснато проследяване на серумните електролити, корекция на електролитите и алкално-киселинните дисбаланси.

Нежелани реакции

Приложението на по-големи количества от разтвора може да доведе до хипернатриемия и хиперхлоремия.

Забележка:

Пациентите се съветват да уведомят своя лекар или фармацевт относно всички странични ефекти, които изпитат във връзка с прилагането на препарата.

Срок на годност

Продуктът не бива да се употребява след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Указания за употреба / работа

Разтворът се произвежда в едnodозови опаковки.

Неизразходваното количество да се изхвърли.

Съдържанието на опаковката да се използва незабавно след отваряне на опаковката.

Да се използва само ако разтворът е бистър и опаковката не е повредена.

Дата на последната редакция:

07. 97

B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
D-34209 Melsungen
Germany



Schwarz

