

ALIUD<sup>®</sup> PHARMA GmbH & Co.KG D-89150 Laichingen, Germany оригинал

Приложение към опаковката

Скъпи пациенти,

Моля, прочетете внимателно настоящето указание за употреба, тъй като то съдържа важна информация относно това, какво трябва да съблюдавате при приложението на лекарствения продукт. Ако имате въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

**УКАЗАНИЕ ЗА НАЧИН НА УПОТРЕБА  
Aciclovir AL Creme HG**

Действащо вещество: Aciclovir - ацикловир

**Състав :**

1 г крем съдържа:

**Фармакологично активни съставки:** Aciclovir - ацикловир 50 mg

**Други съставки /помощни вещества/:** Dimeticone, PEG-5-glycerol-stearate, cetyl alcohol, liquid paraffin, propylene glycol, white vaseline, purified water - диметикон, PEG-5 глицерол стеарат, цетилов алкохол, течен парафин, пропилен гликол, бял вазелин, пречистена вода.

**Данни за опаковката:**

Оригинална опаковка от 5 г и 20 г крем

Aciclovir AL Creme HG представлява противовирусен препарат за лечение на кожни противовирусни заболявания.

**Производител и притежател на разрешението за употреба**

**ALIUD<sup>®</sup> PHARMA GmbH & Co.KG**

**Gottlieb-Daimler-Str. 19, D-89150 Laichingen, Germany**

**Tel. ++49-7333-96510, Fax ++49-7333-21499**

**E-mail: info@aliud.de**

**Internet: <http://www.aliud.de>**

**Показания /индикации/:**

За облекчаване на болките и сърбежа, свързан с рецидивиращ херпес на гениталиите (Herpes genitalis) или устната (Herpes labialis).

**Противопоказания /контраиндикации/:**

**Кога не трябва да прилагате Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ?**  
Вие не трябва да прилагате Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ, ако сте хиперсензитивен /свръхчувствителен/ към Aciclovir – ацикловир или към някое от горепосочените помощни вещества /специално към цетилов алкохол или към пропилен гликол/.

Вие не трябва да прилагате Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ върху мукозни мембрани /напр. в устната кухина, върху очите или вагината/, тъй като може да предизвикате локално възпаление.

**Кога може да използвате Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ чак след разговор с Вашият лекар?**

Ситуациите, описани тук, се отнасят до определени условия, при които Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ може да се прилага само с особена предпазливост. Обсъдете с лекуващия Ви лекар, ако някои от описаните състояния са срещани по-рано при Вас.

Не забравяйте да информирате Вашия лекар преди да започнете лечението, ако сте проявявали смущения в имунната система.

#### **Предпазни мерки при употреба и предупреждения:**

##### **Предпазни мерки:**

За да се постигне максимален успех от лечението с Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ, то трябва да започне възможно най-рано, още когато пациентът забележи първите симптоми на херпес /парене, подуване, дискомфорт, зачервяване/.

##### **Предупреждения:**

Когато използвате Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ в областта на гениталиите или ануса и в същото време използвате латексов кондом, то резистентността на кондомите (презервативите) може да бъде намалена от парафина и петролеевото желе, съдържащо се в Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ, намалявайки надеждността на кондома.

#### **Приложение по време на бременност и кърмене**

Въпреки, че изпитванията по биологични методи не са показали никакви тератогенни ефекти, прилагането на Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ по време на бременност трябва да се извършва само след внимателна преценка относно необходимостта и евентуалния риск.

Прилагането на Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ по време на кърмене в областта на гърдите трябва да се избягва.

#### **Лекарствени взаимодействия:**

За Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ не са познати лекарствени взаимодействия с други лекарствени препарати.

#### **Дозирание и приложение, продължителност на терапията:**

Инструкциите, посочени по-долу, важат само ако Вашият лекар не е предписал друго по отношение на лекарствения препарат Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ. Моля спазвайте указанията за приложение, или тези, дадени от лекуващия лекар, тъй като в противен случай лекарственият препарат Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ няма да има нужния ефект!

**Какво количество и колко често трябва да прилагате Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ?**

Кремът трябва да се нанася в тънък слой 5 пъти дневно на всеки 4 часа върху инфектираната област на кожата.

**Как и кога трябва да прилагате препарата Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ?**

Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ трябва да се нанася с помощта на памучен тампон, като се нанася количеството, необходимо да покрие областта /областите/ на инфектираната кожа. При нанасяне на Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ трябва да се внимава да се покрие не само видимата област на херпеса / мехурчета, подутини, зачервяване/, но така също и граничните /съседните/ области. Ако нанасянето на Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ се извършва с помощта на ръцете, то те трябва преди и след нанасянето да се почистят внимателно, за да се предотврати допълнително инфектиране на кожата например с бактерии, респективно пренасяне на вируси на все още неинфектирани лигавици и области на кожата.

**Колко дълго трябва да прилагате Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ?**

За продължителността на лечението с Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ решава Вашият лекар. Придържайте се, моля, към неговите съвети, ако се чувствате по-добре.

Продължителността на лечението обикновено е 5 дни, но лечението трябва да е индивидуално и да продължи докато мехурчетата започнат да завяхват /загорят/ или се постигне излекуване. При всички случаи, лечението не трябва да превишава 10 дни.

**Грешки при приложението и мерки при предозирание:**

**Какво трябва да съблюдавате, ако сте приложили твърде малко количество от Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ или сте пропуснали приложението му?**

Ако сте пропуснали веднъж прилагането, то продължете терапията, както е предписано /Вие не трябва да прилагате крема по-често или да нанасяте дебел слой от него/.

**Какво трябва да се направи, когато лечението с Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ се прекъсне или преждевременно се преустанови?**

За успешното лечение е важно Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ да се прилага достатъчно дълго. Ако лечението обаче бъде безуспешно или се

проявят определени странични въздействия, посъветвайте се, моля, с Вашия лекар.

#### **Нежелани лекарствени реакции:**

##### **Какви нежелани лекарствени реакции могат да се проявят при приложението на Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ?**

Ако при Вас се срещнат нежелани лекарствени реакции, които не са описани в настоящото указани при употреба, съобщете това, моля, на лекуващия лекар или фармацевт. Прилагането на Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ може да доведе до парене или смъдене на третираното място. Често може да се наблюдава зачервяване, изсушаване, лющене на третираното с Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ място.

Съществуват единични съобщения относно поява на контактни дерматити вследствие на прилагане на Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ. Проведените алергологични проучвания показват, че в повечето случаи на изявена алергична реакция към крема, тя се дължи на помощните вещества, а не на действащото вещество Aciclovir - ацикловир. Контактни дерматити могат да се наблюдават главно, когато нежеланите лекарствени реакции са в изострена форма, или когато се третира област на кожата, извън показаното място. Обсъдете това с лекуващия лекар.

##### **Какво да направим при поява на нежелани лекарствени реакции?**

Моля, информирайте Вашия лекар за появилите се нежелани лекарствени реакции, за да може той да ги лекува специфично.

#### **Годност и стабилност на този лекарствен препарат:**

Датата на изтичане на срока на годност е отпечатана на тубата и на картонената опаковка. Не използвайте препарата след тази дата!

##### **Как трябва да съхранявате Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ?**

Съхранявайте Aciclovir AL Creme HG – Ацикловир АЛ крем ХГ при температура под 25°С.

**Лекарството да се съхранява на недостъпно за деца място!**

**Регистрационен №**

**Дата на актуализация на информацията**

август 1995