

ALIUD® PHARMA GmbH & Co.KG D-89150 Laichingen, Germany оригинал

Приложение към опаковката

Скъпи пациенти,

Моля, прочетете внимателно настоящето указание за употреба, тъй като то съдържа важна информация относно това, какво трябва да съблюдавате при приложението на лекарствения продукт. Ако имате въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

**УКАЗАНИЕ ЗА НАЧИН НА УПОТРЕБА
Aciclovir AL Creme**

Действащо вещество: Aciclovir - ацикловир

Състав:

1 г крем съдържа:

Фармакологично активни съставки: Aciclovir - ацикловир 50 mg

Други съставки /помощни вещества/: Dimeticone, PEG-5-glycerol-stearate, cetyl alcohol, liquid paraffin, propylene glycol, white vaseline, purified water -диметикон, PEG-5 глицерол стеарат, цетилов алкохол, течен парафин, пропилен гликол, бял вазелин, пречистена вода.

Данни за опаковката:

Оригинална опаковка от 2 g крем

Aciclovir AL Creme представлява лекарство за лечение на вирусни заболявания на кожата.

Производител и притежател на разрешението за употреба:

ALIUD® PHARMA GmbH & Co.KG

Gottlieb-Daimler-Str. 19, D-89150 Laichingen, Germany

Tel. ++49-7333-96510, Fax ++49-7333-21499

E-mail: info@aliud.de

Internet: <http://www.aliud.de>

Показания /индикации/:

За облекчаване на болките и сърбежа при рецидивиращ херпес на устната (Herpes labialis).

Противопоказания /контраиндикации/:

Кога не трябва да прилагате Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем?

Вие не трябва да прилагате Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем, ако сте хиперсензитивни /свръхчувствителни/ към Aciclovir – ацикловир или към някое от горепосочените помощни вещества /специално към цетилов алкохол или към пропилен гликол/.

Вие не трябва да прилагате Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем върху лигавици /напр. на устата или върху очите/, тъй като може да предизвикате локално възпаление.

Кога може да използвате Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем чак след разговор с Вашият лекар?

Ситуациите, описани тук, се отнасят до определени условия, при които Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем може да се прилага само с особена предпазливост. Обсъдете с лекуващия Ви лекар, ако някои от описаните състояния са срещани по-рано при Вас.

Не забравяйте да информирате Вашия лекар преди да започнете лечението, ако сте проявявали смущения в имунната система.

Какво трябва да съблюдавате по време на бременност и кърмене?

Въпреки, че биологичните изпитвания не са показвали никакви тератогенни ефекти, прилагането на крема по време на бременност трябва да се извършва само след внимателна преценка относно необходимостта и евентуалния рисък. Прилагането на крема по време на кърмене в областта на гърдите трябва да се избягва.

Предпазни мерки при употреба и предупреждения:

Какво трябва да съблюдавате при участие в уличното движение, както и при работа с машини или при работа без сигурна опора?

Не е известно директно влияние на Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем върху възможностите за реакция и участие в уличното движение.

За какво още трябва да внимавате?

За да се постигне максимален успех от лечението с Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем, то трябва да започне възможно най-рано, още когато пациентът забележи първите симптоми на херпес /парене, подуване, дискомфорт, зачеряване/. Противовирусното третиране с Aciclovir AL creme – Ацикловир АЛ крем е нецелесъобразно, когато вече раните започнат да се покриват с коричка.

Лекарствени взаимодействия:

Кои други лекарствени препарати могат да повлияват ефекта на Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем?

За Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем не са познати лекарствени взаимодействия с други лекарствени препарати.

Какви храни, напитки или други вещества трябва да се избягват?

Не е известно неблагоприятно въздействие на хани, напитки или други вещества.

Дозиране и приложение, продължителност на терапията:

Тези инструкции важат, само ако Вашият лекар не е предписал друго по отношение на лекарствения препарат *Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем*. Моля спазвайте указанията за приложение, или тези, дадени от лекуващия лекар, тъй като в противен случай лекарственият препарат *Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем* няма да има нужния ефект!

Какво количество и колко често трябва да прилагате лекарствения препарат *Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем*?

Кремът трябва да се нанася в тънък слой 5 пъти дневно на всеки 4 часа върху инфицираната област на кожата.

Колко дълго трябва да прилагате *Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем*?

Продължителността на лечението обикновено е 5 дни. Ако по време на лечението състоянието на кожата се влоши или след лечение в продължителност на 10 дни мехурчетата не завехнат /загорят/ или не се излекуват, лечението трябва да се преустанови и да се потърси консултация с лекар.

За продължителността на лечението с *Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем* решава Вашият лекар. Придържайте се, моля, към тази продължителност, ако се почувстввате по-добре.

Как и кога трябва да прилагате лекарствения препарат *Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем* ?

Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем трябва да се нанася с помощта на памучен тампон, като се нанася количеството, необходимо да покрие областта на инфицираната кожа.

При нанасяне трябва да се внимава да се покрие не само видимата област на херпеса /мехурчета, подутини, зачеряване/, но така също и граничните /съседните/ области.

Ако нанасянето на крема се извършва с помощта на ръцете, то те трябва преди и след нанасянето да се почистят интензивно, за да се предотврати допълнително инфициране на кожата например с бактерии, респективно пренасяне на вируси на все още неинфекцирани лигавици и области на кожата.

Грешки при приложението и мерки при предозиране:

Какво трябва да съблюдавате, ако сте приложили твърде малко количество от *Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем* или сте пропуснали приложението му?

Ако сте пропуснали веднъж прилагането, то продължете терапията, както е предписано/ Вие не трябва да прилагате крема по-често или да нанасяте дебел слой от него/.

Какво трябва да се направи, когато лечението с Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем се прекъсне или преждевременно се преустанови?

За успешното лечение е важно Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем да се прилага достатъчно дълго. Ако лечението обаче бъде безуспешно или се проявят определени нежелани лекарствени реакции, посъветвайте се , моля, с лекар /вижте също “Дозиране и приложение, продължителност на терапията”, както и “Страницни въздействия”.

Нежелани лекарствени реакции:

Какви нежелани лекарствени реакции могат да се проявят при приложението на Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем ?

Прилагането на Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем може да доведе до парене или смъдене на третираното място. Често може да се наблюдава зачервяване, изсушаване, лющене на третираното с Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем място.

Съществуват единични съобщения относно поява на контактни дерматити вследствие на прилагане на крема. Проведените алергологични проучвания показват, че в повечето случаи на изявена алергична реакция към крема, тя се дължи на помощните вещества, а не на действащото вещество Aciclovir - ацикловир.

Контактни дерматити могат да се наблюдават главно, когато нежеланите лекарствени реакции са в изострена форма, или когато се третира област на кожата, извън показаното място.

Ако при Вас се срещнат нежелани лекарствени реакции, които не са описани в настоящото указаны при употреба, съобщете това, моля, на лекуващия лекар или фармацевт.

Какво да направим при поява на нежелани лекарствени реакции?

Моля, информирайте Вашия лекар за появилите се нежелани лекарствени реакции, за да може той да ги лекува специфично.

Годност и стабилност на този лекарствен препарат:

Датата на изтичане на срока на годност е отпечатана на тубата и на картонената опаковка. Не използвайте препарата след тази дата!

Съхранявайте Aciclovir AL Creme – Ацикловир АЛ крем при температура под 25° С.

Лекарственото средство да се съхранява на недостъпно за деца място!

Регистрационен №

Дата на информацията

август 1995

Отпуска се задължително в аптека.