



ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

PROSULF

PROTAMINE SULPHATE

Прочетете внимателно листовката преди да започнете лечение с този лекарствен продукт. Тя Ви запознава в общи линии с много съществени неща, които трябва да знаете. Ако желаете да научите повече за това лекарство или сте несигурни за нещо, обърнете се към Вашия лекар.

Пазете листовката през целия курс на лечение.

Името на Вашето лекарство е Prosulf / Protamine sulphate/

Prosulf съдържа активна съставка Protamine Sulphate Euph.

Концентрацията в една ампула е 10 мг/мл.

Вашето лекарство съдържа като допълнителни съставки натриев хлорид, дестилирана вода и в минимални количества /следи/ солна киселина и натриев хидрохлорид.

Prosulf е прозрачен, безцветен разтвор за инжекционно приложение. Предоставя се в картонена опаковка по 10 стъклени ампули. Всяка ампула съдържа 5 мл. от разтвора.

Как действа Вашето Лекарство ?

Protamine sulphate е антидот на хепарина, който действа в комбинация с хепарин и предотвратява прекомерното му противосъсирващо действие в кръвта.

Прилага се преди операции, след хемодиализа, след отворена сърдечна операция при обилно кървене вследствие прилагане или предозиране на хепарин.

Prosulf не се прилага при алергия или съмнение за алергия в миналото към протамин сулфат или някоя от допълнителните съставки в ампулата.

Прочети внимателно списъка на допълнителните съставки!

Задължително уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите !

Указания за приложение

- Просулф трябва да се прилага само като антидот на хепарина. Не е подходящо да се използва като антидот на други антикоагуланти, които се прилагат през устата.
- По време на лечението задължително се следят показателите на кръвосъсирване и от резултатите от тестовете се определя необходимостта от следващи дози.
- Прилага се с особено внимание при пациенти с предшестващи сърдечни операции.



- При пациенти , които са на лечение с инсулин ,Prosulf може да предизвика проблем , ако са лекувани с протамин инсулин.
- Ако сте алергични към риба , би трябвало да сте алергични и към Prosulf , тъй като в рибата се съдържа протамин сулфат.
- Ако сте мъж и сте прекарвали операция за стерилитет или сте безплоден , уведомете своя лекар.
- Prosulf не се препоръчва при деца.

Начин на приложение

Prosulf се прилага бавно , венозно в инфузия за около 10 минути.

Дозата се определя от количеството и вида хепарин , начина на приложението му и от времето на последната инжекция. Еднократната доза не трябва да превишава 50 мг. Протамин сулфат. Дозата се определя най-точно от Вашия лекар , с когото следва да се консултирате , ако нещо не Ви е ясно или имате съмнения.

Странични реакции

Както много други лекарства Prosulf може да даде нежелани странични реакции , особено при болни , при които се прилага за пръв път. Те се изразяват в забавяне на пулса , ниско кръвно налягане / може да почувствате виене на свят , отпадналост/, високо кръвно налягане , задух , зачервяване , чувство на затопляне по цялото тяло, болки в гърба , гадене , силна отпадналост.

Рядко се наблюдават алергични реакции , изразяващи се в задух или обрив.

Понякога те могат да бъдат много сериозни – припадък или колапс , оток на лицето и устните , посиняване на устните и езика.

Вашият лекуващ лекар трябва да може да лекува тези странични реакции , ако се появят.

Ако имате други оплаквания или усещате , че се чувствате зле от това лекарство , веднага уведомете Вашия лекар.

Как да се съхранява това лекарство?

- Не трябва да се използва , ако е изтекъл срокът на годност , отбелязан на опаковката или ако инжекционният разтвор е мътен или с променен цвят.
- Ампулите се съхраняват при температура до 25 С в картонена опаковка или в съответен контейнер .
- Prosulf трябва да се пази от деца!

Производител :

CP Pharmaceuticals Ltd , Ash Road North , Wrexham , LL 13 9UF , UK.

Притежател на разрешението за употреба :

ДВК Фарма ЕООД , бул. Княгиня Мария Луиза № 64 , 1202 София , България.

