

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
Proviron
Провирон
/mesterolone/

За перорална андрогенна терапия при мъже
Важна информация , моля прочетете я внимателно !

Състав

1 таблетка Провирон съдържа активна съставка местеролон 25 mg
други съставки: лактозенmonoхидрат, царевично нишесте, поливидон 25 (0), метил парагидроксибензоат, пропил парагидроксибензоат, магнезиев стеарат

Свойства

Провирон балансира недостига на образуване на андрогени , които започват да спадат постепенно с напредването на възрастта. Затова той е подходящ за лечение на всички състояния , предизвикани от недостатъчното образуване на ендогенни андрогени.

В препоръчаните дози ; Провирон не уврежда сперматогенезата. Той се понася особено добре от черния дроб.

Показания

Намалена физическа активност в средна и напреднала възраст
Оплаквания , дължащи се на недостиг на андрогени- намалена физическа активност, лесно изморяване , нарушена концентрация , отслабване на паметта , смущения на либидото и потентността , раздразнителност , смущения на съня , депресивни настроения и общи вегетативни оплаквания могат да се превъзмогнат или подобрят чрез употребата на Провирон таблетки.

Смущения на потентността

Смущенията на потентността , предизвикани от недостиг на андрогени се отстраняват при прилагане на Провирон. Ако смущенията се дължат предимно на други фактори или последните допринасят за тях , Провирон може да се прилага заедно с други терапевтични мерки.

Хипогонадизъм

Растежът , развитието и функцията на андрогено-зависимите прицелни органи се стимулират от Провирон. Той спомага за развитието на вторичните мъжки полови белези в случаи на пред пубертетен недостиг на андрогени.

Провирон премахва симптомите на недостиг , в случаи , когато след пубертета се наблюдава функционална недостатъчност на гонадите.

Инферилилит

Причина за инферилилита може да бъде олигозооспермията и недостатъчно секретиране от Лайдиговите клетки. При употреба на Провирон броят на сперматозоидите и качеството на спермата , както и концентрацията на фруктоза в еякулата се подобрява или нормализира , като с това се увеличават шансовете за зачеване.

Дозировка и начин на приложение

Таблетките трябва да се погълнат цели , с малко течност.

Ако лекарят не е предписал друго се препоръчват следните дозировки :

Намалена физическа активност и смущения на потентността

Начално лечение : По 1 таблетка Провирон 3 пъти дневно

След задоволително клинично подобрение може да се опита намаляване на дозата.

Продължително лечение : По 1 таблетка Провирон 2 или 1 път дневно.

В зависимост от вида и тежестта на оплакванията , в по-нататъшното лечение , дозата трябва да се адаптира към индивидуалните потребности.Препоръчва се лечение в продължение на няколко месеца.

При хипогонадизъм е необходимо продължително лечение

За развитие на вторични мъжки полови белези по 1-2 таблетки Провирон 3 пъти дневно в продължение на няколко месеца.

Поддържаща доза - често е достатъчна по 1 таблетка 2-3 пъти дневно.

Инфертилитет- за подобряване на количеството и качеството на сперматата

По 1 таблетка Провирон 2-3 пъти дневно за един цикъл на сперматогенеза , т.е. в продължение на около 90 дни.Ако е необходимо лечението с Провирон може да се повтори след няколко седмици.

За постигане на по-високи концентрации на фруктоза в еякулата при пост-пубертетна недостатъчност на Лайдиговите клетки : По 1 таблетка Провирон 2 пъти дневно в продължение на няколко месеца.

Нежелани лекарствени реакции

Ако , в отделни случаи се появят чести или продължителни ерекции , дозата трябва да се намали или лечението трябва да се прекрати , за да се избегне увреждане на пениса.

Противопоказания

Карцином на простатата чернодробни тумори или анамнеза за такива.

Специални предупреждения

Андрогените не са подходящи за засилване на мускулното развитие при здрави индивиди или за повишаване на физическите способности.

Провирон е предназначен само за мъже.

Профилактично трябва да се извършва редовен преглед на простатата.

В редки случаи , след употреба на хормони , каквато е активната съставка на

Провирон са наблюдавани доброкачествени , а в още по-редки случаи-злокачествени чернодробни тумори , предизвикващи в изолирани случаи живото-застрашаващи интраабдоминални кръвоизливи.При появя на оплаквания от тежест в горната абдоминална област , на увеличение на черния дроб или на интраабдоминален кръвоизлив в диференциалната диагноза трябва да се мисли за чернодробен тумор.

Брошурата за специалиста съдържа по-подробна информация.

Провирон се предлага в таблетки от 25 mg по 20 или по 50 в опаковка. Да се съхранява в места , недостъпни за деца.
Да не се използва след изтичане срока на годност , означен върху опаковката.

Производител
Schering GmbH and Co Pr.
Dobereinerstrabe 20
99427 Weimar Germany

Носител на регистрацията
Schering AG
Muellerstrasse 170-178
D-13342 Berlin,Germany

Дата на последна редакция на текста
29.03. 1999 г.