


**Информация за пациента.**

**Моля, прочетете внимателно !**

**Reumador® gel**  
**Реумадор гел**



**Състав**

*Лекарствено вещество:* Piroxicam 5 mg в 1 g гел.

*Помощни вещества:* етанол 96 %, глицерол, макрогол 400, бензилов алкохол, карбомер 980, троламин, пречистена вода.

**Лекарствена форма и опаковка**

Гел

Съдържание на 1 опаковка: 58 g гел

**Производител и притежател на разрешението за употреба**

Зентива АД

Хлоховец, Словацка република

**Фармакотерапевтична група**

Нестероидно, противовъзпалително средство.

**Действие**

Реумадор гел е лекарствен продукт за локално приложение. Притежава антиревматично и противовъзпалително действие и облекчава болката в засегнатите тъкани. При локално приложение лекарственото вещество прониква в подкожните тъкани, синовиалната течност и ставните капсули.

**Показания**

Лекарственият продукт е подходящ за употреба при възрастни и юноши.

Лекарственият продукт е предназначен за локално лечение на протичащи с болка възпалителни заболявания на мускулно-скелетната система – тендинит, тендовагинит, синовит, възпаления на фасциите и ставните връзки, бурсит; болезнен синдром на неподвижно рамо; както и за лечение на посттравматични навяхвания, изкълчвания и контузии и постоперативни промени на двигателния апарат.

Прилага се и като допълнително средство в комплексната терапия на остър и хроничен ревматоиден артрит, остеоартрит, остеоартроза, алкилозиращ спондилит, псориаатричен артрит, подагрозен артрит, дегенеративни ставни заболявания, болка в шията, гърба или кръста от различен произход.

**Противопоказания**

Свръхчувствителност към пироксикам, ацетилсалицилова киселина или други



нестероидни противоревматични средства или към някое от помощните вещества. Да не се прилага върху открити рани, възпалена или инфектирана кожа, да се избягва контакта с очите и лигавиците. Да не се прилага при пациенти, страдащи от бъбречна недостатъчност. Не трябва да се употребява при деца под 6 годишна възраст и по време на бременност и кърмене.

### **Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба**

При недостатъчно втриване на гела е възможна преходна промяна на цвета на кожата.

Лекарственият продукт съдържа алкохол, поради това е възможно изсушаване на кожата особено при по-продължителна употреба.

Пациенти с астма, алергичен ринит, хронична обструктивна белодробна болест или хронични инфекции на белите дробове са по-чувствителни към нестероидните противовъзпалителни средства и понякога реагират с пристъпи на астма, локален мукокутанен едем или уртикария.

Посъветвайте се с Вашия лекар относно едновременната употреба на Реумадор гел с други лекарствени продукти. Не използвайте лекарствения продукт повече от 10 дни без предписание от лекуващия лекар. Ако в продължение на 7 дни не настъпи подобрение в състоянието, или при евентуално влошаване е необходимо да се посъветвате с лекуващия лекар относно по-нататъшното приложение на Реумадор гел.

### **Лекарствени взаимодействия**

При локално приложение досега не са наблюдавани взаимодействия с други лекарствени продукти.

### **Дозировка и начин на приложение**

Ако лекарят не е предписал друго, 2-4 g гел (с размер колкото орех) се нанасят върху болния участък 3-4 пъти дневно и внимателно се втрива в кожата. Времето между отделните приложения трябва да бъде най-малко 4 часа. Намазаният участък не трябва да се покрива, да не се използват еластични превръзки.

### **Предозиране**

При случайно поглъщане на част от лекарствения продукт от дете трябва незабавно да извикате лекар.

### **Нежелани лекарствени реакции**

Реумадор гел обикновено се понася добре, но понякога може да се наблюдава свръхчувствителност (алергия) към лекарственото вещество. Алергията се извява със зачервяване, сърбеж, парене и оток в мястото на приложение на гела. В случай на поява на нежелани лекарствени реакции или други необичайни реакции трябва да се консултирате с лекуващия лекар относно по-нататъшното приложение на лекарствения продукт.

В редки случаи могат да се наблюдават по-изразени алергични реакции като ринит,



уртикария, отоци или затруднено дишане. При поява на тези нежелани лекарствени реакции, употребата на лекарствения продукт трябва да се прекрати и да се потърси лекуващия лекар.

**Съхранение**

Да се съхранява под 25°C в добре затворена опаковка. Да се пази от светлина. Да не се замразява.

**Срок на годност**

4 години

Срок на годност след първо отваряне на тубата: 1 месец.

**Внимание**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Последна редакция : 250405

**Адрес за контакти**

ТП Зентива Интернешънъл АД  
бул. "Н. Вапцаров" № 25  
1407 София  
тел. 9 62 41 91 , 9 62 41 40

