



## Информация за пациента

Уважаеми пациенти,  
Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт!

### TRACHISAN® - ТРАХИЗАН Таблетки за смучене

За лечение на възпаления и инфекции на устната кухина и гърлото.  
Без захар

#### Състав

Една таблетка съдържа:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Тиротрицин            | 0,5 mg |
| Хлорхексидин глюконат | 1,0 mg |
| Лидокаин хидрохлорид  | 1,0 mg |

Помощни вещества: Сорбитол, магнезиев стеарат, ментово масло.

#### Какво представлява Трахизан?

Таблетки за смучене – 20 броя в опаковка.

Възпаленията в устната кухина могат да се причинят от патогенни и други фактори. Симптомите са зачервяване и свръхчувствителност на лигавиците, придружено с чувство на парене в областта на устата, затруднено преглъщане, възпалено гърло и дрезгав глас.

Комбинацията от активни вещества, съдържащи се в таблетките Трахизан, има антибактериално, антисептично и болкоуспокояващо действие, което значително подобрява оплакванията.

Таблетките Трахизан не съдържат захар, следователно не създават риск за развитие на кариес.

#### За какво се използва Трахизан?

Трахизан се използва за локално лечение на възпаления в устната кухина и гърлото, като възпаления на устна лигавица и венци, пародонтит, глосит, ангина и фарингит; затруднено преглъщане. За профилактика на инфекции преди и след хирургични операции в устната кухина и гърлото (вадене на зъб, хирургично лечение на венци, тонзилектомия).

#### Кога не трябва да взимате или да използвате Трахизан?

Продуктът не трябва да се използва при известна свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта, обширни разязвявания на устната лигавица, големи пресни рани в устната кухина.

Да не се използва при деца под 6 годишна възраст.



В случаи на непоносимост към фруктоза, лечението се провежда само след консултация с лекар.

### **Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Трахизан?**

#### *Бременност и кърмене:*

Досега няма съобщения за вредни ефекти на Трахизан при използване по време на бременност и кърмене. Поради липсата на данни, по време на бременност и кърмене продуктът може да се употребява само след консултация с лекар.

#### *Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:*

Трахизан таблетки се предполага, че са безопасни и е малко вероятно да окажат въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

### **Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Трахизан или могат да бъдат повлияни?**

Досега не са известни прояви на лекарствени взаимодействия.

### **Специални предупреждения**

Този лекарствен продукт съдържа сорбитол. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя до 0,69 g сорбитол, съответстващо на 0,057 хлебни единици.

Неподходящ при вродена непоносимост към фруктоза. Може да причини стомашно дразнене и диария.

Поради понижаването на чувствителността в областта на орофаринкса е възможно неволно попадане на съдържание на устната кухина в дихателните пътища, което налага повишено внимание при употреба от пациенти под 12 годишна възраст.

Предупреждение за спортисти: При употреба на Трахизан могат да се позитивират тестовете за допингов контрол.

### **Как можете да използвате Трахизан?**

При възрастни: Една таблетка се смуче през интервали от два часа, до 8 пъти дневно; деца над 6 години – до 6 пъти дневно.

При редовна употреба на продукта оплакванията обикновено отзвучават след няколко дни.

#### *Продължителност на лечението:*

За да се осигури траен успех на лечението, Трахизан се приема за още 2-3 дни, дори след изчезване на симптомите. При липса на значително подобрение след 5 дни е необходима консултация с лекар.

Трахизан не трябва да се използва повече от 2 седмици без прекъсване, освен ако не е предписано друго от лекар или стоматолог.



**Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Трахизан?**

Поради фармакологичните свойства на продукта не се очакват токсични ефекти дори при случайно поглъщане на големи количества Трахизан.

Лечение на избор при поглъщане на много големи количества е стомашна промивка.

**Какви нежелани реакции може да предизвика Трахизан?**

Трахизан таблетки като цяло се понася добре, но продуктът може да доведе до намаляване на вкусовите усещания и изтръпване на езика, които по правило изчезват напълно.

Жълтото до кафеникаво оцветяване на зъби, пломби, протези и език, което се появява в редки случаи при продължителна употреба може да бъде отстранено чрез старателна устна хигиена; това също изчезва спонтанно след спиране употребата на продукта.

**Съхранение на Трахизан Таблетки**

Да се съхранява на сухо място, при температура под 25°C!

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

**Срок на годност**

Срок на годност 5 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност

**Производител и притежател на разрешението за употреба**

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden,

Germany

Медицинско представителство в България

Либра АД

**Дата на последната редакция на листовката**

Април 2004

