

AGGRASTAT® Concentrate for infusion

(АГРАСТАТ)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

И А Л
О Д О Б Р Е Н О !
 ДАТА21.09.04....

Какво представлява AGGRASTAT?

AGGRASTAT (tirofiban hydrochloride) е предназначен за венозно приложение. В един милилитър AGGRASTAT Concentrate for Injections се съдържат 0,281 mg tirofiban hydrochloride monohydrate, еквивалентни на 0.25 mg tirofiban.

Освен това AGGRASTAT съдържа следните помощни вещества: анхидрат на лимонената киселина, натриев цитрат дихидрат и натриев хлорид.

AGGRASTAT се предлага като концентриран разтвор за разреждане (флакони от 50 ml).

AGGRASTAT принадлежи към групата препарати, наречени инхибитори на тромбоцитната агрегация.

Притежател на разрешението за употреба:	Производител:
MSD IDEA INC., Глатбруг - Швейцария	Merck Sharp & Dohme B.V., Харлем - Холандия

Защо мойт лекар ми е предписал AGGRASTAT?

Намаленият кръвоток към сърцето може да доведе до появата на характерна гръден болка, наречена нестабилна стенокардия. Вашият лекар Ви е предписал AGGRASTAT, за да се подпомогне кръвоснабдяването на сърцето и да се избегнат усложненията на това заболяване като например инфаркт на миокарда. AGGRASTAT се използва и при пациенти, на които е направена балонна дилатация за подобряване на кръвоснабдяването на сърдечния мускул.

Как действа AGGRASTAT?

AGGRASTAT действа чрез блокиране на тромбоцитите, които циркулират в кръвта и участват в кръвосъсирването. Като блокира един рецептор върху тромбоцитната мембрана, AGGRASTAT пречи на тромбоцитите да се слепват един с друг и да образуват съсиреци, които могат да намалят кръвотока към сърцето и да предизвикат гръден болка или инфаркт.

Какво трябва да знам преди да започна да се лекувам с AGGRASTAT?**Кой не трябва да използва AGGRASTAT?**

Не трябва да използвате AGGRASTAT, ако:

- сте алергични към някоя от съставките му (Виж раздел Какво представлява AGGRASTAT?).
- имате кръвоизлив от вътрешните органи.
- сте имали в миналото вътречерепен кръвоизлив, вътречерепен тумор, малформация на кръвоносни съдове или аневризма.
- сте имали тромбоцитопения (намален брой на тромбоцитите) при предишна употреба на AGGRASTAT.

Ако не сте сигурни дали можете да започнете лечение с AGGRASTAT, обсъдете проблема със своя лекар или друг специалист.

Употреба при бременност и по време на кърмене**Употреба при бременност**

Трябва да уведомите своя лекар, ако сте бременна. Той/тя ще реши дали да взимате AGGRASTAT.

Употреба при кърмене

Посъветвайте се със своя лекар, ако кърмите или предвиждате да кърмите.



Какво трябва да кажа на моя лекар преди или по време на употреба на AGGRASTAT?

Споделете със своя лекар всички минали заболявания и алергии.

Съобщете на своя лекар, ако имате или сте имали:

- скорошен кръвоизлив (през последната 1 година) например от стомаха и червата или кръв в урината или изпражненията
- нарушение в тромбоцитите или тромбоцитопения (намален брой на тромбоцитите) в миналото
- мозъчно-съдов инцидент в миналото (през последната 1 година)
- голяма операция или сериозна травма през последния месец
- скорошна спинална/епидурална интервенция
- анамнеза или симптоми на аортна дисекация
- високостепенна неконтролирана артериална хипертония (високо кръвно налягане)
- възпаление на външната покривка на сърцето (перикардит)
- проблеми с кръвоносните съдове на ретината
- лечение с препарати за разграждане на тромби
- бъбречно заболяване

Употреба при деца.

Безопасността и ефективността при деца не са проучени.

Мога ли да употребявам едновременно AGGRASTAT и други лекарства?

По принцип AGGRASTAT може да се използва с други препарати. Все пак е нужно да уведомите своя лекар за другите лекарства, които приемате, включително и тези, които се продават без рецепт, тъй като различните лекарства могат да си взаимодействат. Особено важно е да му кажете, в случай че взимате други медикаменти против съсирване на кръвта, като например варфарин.

Как трябва да се употребява AGGRASTAT?

AGGRASTAT се поставя венозно от медицинско лице. Вашият лекар ще определи необходимата доза според състоянието и телесното ви тегло.

Какво трябва да правя в случай на предозиране?

Най-честата проява на предозиране е кървенето. Ако получите кръвоизлив, трябва незабавно да уведомите своя лекар.

Какви нежелани лекарствени реакции може да има AGGRASTAT?

Всяко лекарство може да даде нежелани реакции. Най-честата нежелана реакция от приложението на AGGRASTAT е кървенето. Има съобщения и за повишена температура, гадене и главоболие.

Незабавно съобщете на своя лекар и или на друго медицинско лице за появата на тези или други необичайни явления.

Как мога да науча нещо повече за AGGRASTAT?

Повече информация можете да получите от своя лекар или фармацевт, които имат по-подробни познания за AGGRASTAT и за вашето заболяване.

Кога за последен път е била редактирана тази листовка?

Тази листовка е била редактирана за последен път през месец април 2003.

