

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно следната информация за употреба, тъй като тя съдържа важни сведения за това какво трябва да съблюдавате при употреба на този лекарствен продукт. Ако имате въпроси, моля, обръщайте се към Вашия лекар или фармацевт.

Информация за употреба

Esberitox® N Tabletten Есберитокс® N таблетки

Количествен и качествен състав

1 таблетка съдържа:

Лекарствено вещество:

0,215 ml алкохолно-воден извлек (1:11), съответстващ на:

Thujae Occidentalis Herba	2,0 mg
Baptisiae tinctoriae Radix	10,0 mg
Echinaceae purpureae / Echinaceae pallida Radix (1+1)	7,5 mg
Екстрагент етанол 30 % (V/V)	

Помощни вещества:

Аскорбинова киселина, лактоза, магнезиев стеарат, макрогол, захароза.

Лекарствена форма и съдържание

Таблетка	
Оригинална опаковка	50 таблетки
Оригинална опаковка	60 таблетки
Оригинална опаковка	100 таблетки

Фармакологична група / начин на действие

Имуномодулатор за повишаване на защитните сили на организма.


Фармацевтична фирма

Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG, Bahnhofstraße 35, D-38259 Salzgitter
Telefon (0 53 41) 3 07-0, Telefax (0 53 41) 3 07-1 24
info@schapper-bruemmer.de
http://www.schapper-bruemmer.de

Показания

За съпътващо лечение при:

- ♦ остри и хронични инфекции на дихателните пътища (причинени от вируси или бактерии);
- ♦ лечение с антибиотици при тежки бактериални инфекции като бронхити, ангина, фарингити (възпаления на гърлото), отити (възпаления на средното ухо), синусити (възпаления на носните кухини);
- ♦ бактериални инфекции на кожата



- ◆ податливост на инфекции въз основа на временно отслабване на защитните сили;

Противопоказания

Кога не трябва да приемате Есберитокс[®]N таблетки?

При известна свръхчувствителност към някоя от съставките или към сенникоцветни. По принцип да не се прилага при прогресиращи системни заболявания като туберкулоза, левкози (системно заболяване, характеризиращо се с прогресивно нарастване на тъканите, произвеждащите левкоцити), колагенози (възпалителни заболявания на съединителната тъкан), мултипленна склероза, СПИН и други автоимунни заболявания (образуване на антитела спрямо собствените тъкани). Поради липсата на достатъчно изследвания, не се препоръчва употребата на лекарствения продукт по време на бременност и кърмене.

Лекарствени взаимодействия

Кои други лекарства повлияват действието на Есберитокс[®]N таблетки?

Няма известни.

Дозировка, начин и продължителност на употреба

Ако Вашият лекар не е предписал друго, моля спазвайте следните указания. Моля, спазвайте предписанието за начина на приложение, защото в противен случай таблетките Есберитокс[®]N не могат да действат правилно!

Колко често и в какво количество трябва да приемате Есберитокс[®]N таблетки?

Възрастните приемат 3 пъти дневно по 3 таблетки; деца до 6 години 3 пъти дневно по 1-2 таблетки, деца до 12 години 3 пъти дневно по 2 таблетки. Това съответства на дневна доза от 9 таблетки за възрастни и 3-6 таблетки за деца.

Как и кога трябва да приемате Есберитокс[®]N таблетки?

Таблетките се приемат през устата сутрин, обед и вечер или се оставят да се разтопят в устата.

Колко дълго трябва да приемате Есберитокс[®]N таблетки?

Продължителността на приложението се определя от основното заболяване.

Предупреждения

Лекарственият продукт съдържа лактоза и захароза, като една таблетка отговаря на 0.02 ХЕ.

Ако в хода на лечението симптомите продължават или състоянието се влоши, консултирайте се с лекар!

Нежелани лекарствени реакции

Какви нежелани лекарствени реакции могат да се проявят по време на приема на Есберитокс[®]N таблетки?

В единични случаи могат да се появят реакции на свръхчувствителност. За лекарства, приготвени от Echinaceae могат да се наблюдават обриви по кожата, сърбеж, рядко отоци по лицето, задух, световъртеж и понижаване на кръвното налягане.



Ако установите нежелани лекарствени реакции, които не са посочени в тази листовка, моля съобщете ги на Вашия лекар или аптекар.

Указания и данни за срока на годност

Срокът на годност на тази опаковка е отпечатан от вътрешната страна на картонената кутия. Не употребявайте това лекарство след посочената на опаковката дата!

Актуализация на информацията

Юли, 2005 г.

Лекарството да се съхранява на място, недостъпно за деца!

