

RICINI OLEUM

Ricini oleum
Рициново масло 50 ml
oral liquid
перорална течност

Състав: Лекарствено вещество: Castor oil 50 ml;

помощни вещества няма

Показания

Слабително средство за краткотрайно лечение при запек.

Начин на употреба:

За възрастни: приема се вътрешно по 15-30 g (1-2 супени лъжици еднократно), може да се приема с топло кафе или лимонов сок; за деца над 6 годишна възраст: (1-3 чаени лъжички еднократно), може да се преме с мед в съотношение 1:1 или разбъркано с кристална захар. Маслото по възможност да се изсипва на задната половина на езика. Ефектът настъпва след 2-6 часа.

Противопоказания

Да не се употребява продължително време, тъй като червата изгубват нормалната си перисталтика.

Да не се прилага при отравяне с мастноразтворими вещества (бензол, фосфорорганични съединения и др.) и лечение с екстракт от мъжка папрат.

Да не се прилага при: хемороидални кръвотечения, възпалителни заболявания на коремните органи (перитонит, апендицит, язвен ентероколит, остър холецистит и др.), запек вследствие на механични препятствия (илеус, инкарцерирана херния и др.), в менструалния период, при обща слабост и склонност към колапс, (особено реконвалесцентни изтощени болни и старческа възраст), при флебитни и трескави състояния (особено при болни с отрицателен воден баланс), при спастичен запек и жълтеница. По време на менструалния период, предизвиква повишено кръвонапълване на органите на малкия таз

специални предупреждения за употреба

Продуктът да не се прилага при деца под 6 годишна възраст. Да не се използва при наличие на болки в стомаха, при позиви за повръщане. При кръвене от ануса, или при кръв в изпражненията, приема на рициново масло трябва да се спре, тъй като това може да е индикация за сериозен проблем. Рициновото масло стимулира маточните контракции. Да не се приема късно вечер – ефектът настъпва в рамките на 2-6 часа.

Да не се употребява при бременност.

Нежелани лекарствени реакции:

Възможна е поява на алергични реакции.

Приложението на продукта може да предизвика привикване на организма при продължително приемане. Прилагането на лекарствения продукт може да е придружено с коликообразни болки, гадене и повръщане. При контакт с очите и/или кожата може да предизвика дразнене.

При предозиране е възможно да се усилят стомашните коликообразни болки и да предизвика гадене, повръщане, колики, тежка диария.

Препоръки при употреба

Продуктът е за краткотрайно лечение на констипация. Не се препоръчва продължителното му приемане.

Режим на отпускане: Без лекарско предписание

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Съхранение: На сухо и защитено от слънчева светлина място, при температура под 25°C.

Парт.№.

Годен до:

Рег №:

ГАЛЕН-ФАРМА ООД с. Калугерово 4462, обл. Пазарджик
Тел 034 444531

4-05-05

9.05.05

C

Galen-pharma

