

Министерство на здравеопазването	
Установен номер Здравният тръбен №	
№1/ 11-02.02г.	

## Макет на първична опаковка

**Carbo activatus 10 g**

**Активен въглен**

**Прах за перорална супензия**

### Показания

Употребява се при отравяния с алкалоиди, със соли на тежки метали, с лекарства, хранителни отравяния, нарушен храносмилане и подуване на червата.

### Начин на употреба

При отравяния – активният въглен трябва да се прилага веднага или до 30 минути след поглъщането на токсичната субстанция. Обичайната доза при възрастни е 50 – 100 г, приета еднократно разтворена във вода. При нужда могат да се приложат повторни дози – 25 – 50 г на 4 или 6 часа. При деца до 1 година – 1 г/кг т.м., приети еднократно, перорално. При деца от 1 – 12 години – 25 – 50 г, приети еднократно, перорално. При нужда тези дози могат да се приложат повторно на всеки 4 или 6 часа.

При нарушен храносмилане и подуване на червата обичайната доза при възрастни е 1 – 2 г, разтворена в чаша вода, приета перорално, 3 пъти на ден, след хранене.

### Предозиране

Не се наблюдават симптоми на предозиране, освен стомашно-чревни реакции. При прием на много високи дози, поради липса на резорбция не се налагат специфични терапевтични мерки.

### Противопоказания

Не се прилага при язви на стомашно-чревния тракт, кръвоизливи.

### Специални предупреждения и предпазни мерки

Необходимо е повишено внимание при липса на чревна перисталтика, поради повишен риск от усложнения, като чревна обструкция /запушване/. Трябва да се избягва продължителната употреба на активен въглен. След употреба на активен въглен изпражненията се оцветяват в черно.

### Лекарствени взаимодействия

Активният въглен трябва да се приема 2 часа преди или след приемането на други лекарства, тъй като нарушува резорбцията и може да намали ефективността им. Активният въглен не трябва да се прилага при

перорално приложение на специфични антидоти /противоотрова, например метионин/.

#### **Бременност и кърмене**

Не са установени проблеми при приложение на активен въглен по време на бременност и кърмене.

#### **Нежелани реакции**

Възможна е поява на запек, повръщане, коремни болки. При продължителна употреба е възможно да се развие недостиг в организма на витамини, хормони, мазнини, белтъчини, което изиска съответна лекарствена или хранителна корекция.

**Да не се употребява след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката!**

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца**

Да се съхранява в суhi, проветриви помещения, на защищено от светлина място, при температура под 25 С.

**Годен до:**

Рег №:

Парт. №

**Без лекарско предписание**

ЕТ "Евелин 29" гр. Перник, ул. Битоля № 17