

MEVACOR®*

МЕВАКОР

(lovastatin, MSD)

таблетки 20 и 40 mg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да взимате лекарството, дори ако използвате препарата от дълго време. Може би част от информацията от предишните листовки е променена.

Запомнете, че лекарят е предписал този лекарствен продукт само на Вас. Не го давайте на никой друг.

Какво представлява MEVACOR ?

MEVACOR (lovastatin, MSD) е таблетка, съдържаща 20 или 40 mg ловастатин като активна съставка.

Освен това, MEVACOR съдържа следните неактивни съставки: лактоза, прежелатинирана скорбяла, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, биутил хидроксанизол, оцветители-синьо (само 20mg таблетки), квинолиново жълто (само 40 mg таблетки).

MEVACOR се предлага в опаковки от 14 и 28 таблетки по 40 и 20mg.

MEVACOR понижава нивото на холестерола в кръвта. Той принадлежи към групата лекарствени препарати, известни като инхибитори на хидроксиметилглутарил - коензим А (HMG-CoA) редуктазата.

Притежател на лиценза:

MSD IDEA INC.,
Глатбруг - Швейцария

Производител:

Merck Sharp & Dohme B.V.,
Харлем - Холандия

Защо лекарят ми предписа MEVACOR ?

Вашият лекар Ви е предписал MEVACOR за понижаване количеството холестерол в кръвта. Вашият лекар може да Ви предпише MEVACOR също така и за забавяне развитието на атеросклероза (упълтняване) на артериите, които кръвоснабдяват сърцето, причинявайки т.нар. исхемична болест на сърцето (ИБС).

Висок холестерол се получава в резултат на действието на редица фактори, като употреба на храни, богати на насытени мазнини, някои заболявания или генетично обусловени състояния, както и липсата на достатъчно физическа активност. Понижаването на нивото на холестерола може да намали риска да развиете ИБС.

Холестеролът може да причини ИБС чрез запушване на кръвоносните съдове, които транспортират кислород и хранителни вещества към сърцето. Това може да причини гръден болка (наречена стенокардия) и сърдечен инфаркт. Чрез понижаване на високото ниво на холестерола може да се забави процеса на отлагане на холестерол в кръвоносните съдове.

Редица причини могат да доведат до ИБС. Рисковете да развиете ИБС могат да

* Запазена марка на MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.



нарастнат, ако са налице няколко фактора:

- висок холестерол,
- високо кръвно налягане,
- тютюнопушене,
- диабет,
- затлъстяване,
- фамилна обремененост,
- мъжки пол и
- менопауза.

От Вас зависи да контролирате първите пет от изброените причини, водещи до ИБС.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СЪХРАНИТЕ ПО-ДЪЛГО СВОЕТО ЗДРАВЕ И ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ РАЗВИТИЕ НА ИБС?

СПРЕТЕ ДА ПУШИТЕ

Пушенето увеличава рисковете от сърдечен инфаркт.

СПОРТУВАЙТЕ

Това ще увеличи нивото на "ДОБЪР" холестерол и ще намали рисковете за развитие на ИБС. Посъветвайте се с Вашия лекар преди да започнете да спортувате.

ПОСЕЩАВАЙТЕ РЕДОВНО ВАШИЯ ЛЕКАР

Лекарят ще контролира Вашия холестерол.

ВЗИМАЙТЕ РЕДОВНО ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Не прекъсвайте Вашето лечение, за да запазите под контрол нивото на холестерола си.

СПАЗВАЙТЕ ДИЕТАТА, ПРЕПОРЪЧНАНА ВИ ОТ ВАШИЯ ЛЕКАР

Диетата ще Ви помогне не само за намаляване на холестерола, но и да намалите теглото си (ако е необходимо).

LDL - холестеролът е наречен "ЛОШ" холестерол, защото именно този тип холестерол причинява запушването на артериите. HDL - холестеролът, от друга страна, се смята че отстранява холестерола от кръвоносните съдове и поради това е възприето да се нарича "ДОБЪР" холестерол.

MEVACOR оказва своето действие чрез понижаване продукцията на холестерол в черния дроб (главният източник на холестерол в организма) и повишава степента на отстраняване на холестерола от кръвообращението Ви чрез черния дроб. С оглед съществуването на LDL и HDL, MEVACOR значително намалява LDL ("ЛОШ" холестерол) и при повечето пациенти увеличава HDL ("ДОБЪР" холестерол). Чрез комбинирането на MEVACOR с диета, Вие поемате контрола върху количеството холестерол, което приемате с храната и количеството, което произвежда Вашия организъм.

При повечето хора, при наличие на висок холестерол не се появяват веднага съответните симптоми. Вашият лекар може да измери количеството на холестерол в кръвта Ви чрез обикновен кръвен тест. Посещавайте редовно Вашия лекар за да проследявате нивото на холестерола и обсъждате с него получените резултати.



Какво трябва да знам, преди да започна лечение с MEVACOR ?

Не употребявайте MEVACOR , ако:

- сте алергичен към някоя от неговите съставки
- имате потвърдена диагноза за активно чернодробно заболяване
- сте бременна или кърмите.

Какво трябва да кажа на моя лекар преди за започна лечение с MEVACOR?

Уведомете Вашия лекар за всички здравни проблеми, които имате или сте имали в миналото, както и за съществуващи алергии.

Уведомете Вашия лекар, ако консумирате по-големи количества алкохол и дали сте прекарали чернодробно заболяване.

Употреба при деца

Безопасността и ефикасността е била проучена при младежи на възраст между 10 и 17 години и при девойки, които са имали менструален цикъл поне отпреди една година (виж: Как трябва да взимам MEVACOR?). MEVACOR не е бил проучен при деца под 10 годишна възраст. За повече информация се обърнете към Вашият лекар.

Употреба при бременност и кърмене

MEVACOR не трябва да се използва при бременни жени, при жени, възнамеряващи да забременеят или тези, за които се предполага, че са бременни. Ако забременеете по време на лечение с MEVACOR , спрете веднага употребата на препарата и незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Жени, провеждащи лечение с MEVACOR не трябва да кърмят.

Мога ли да взимам MEVACOR едновременно с други лекарства?

Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които взимате или планирате да взимате едновременно с MEVACOR, включително и за тези, закупени без рецепт. Също така следва да уведомявате всеки лекар, който Ви предписва лечение с нов лекарствен продукт, че взимате MEVACOR.

Тъй като приема на MEVACOR с изброените по-долу лекарства може да увеличи риска от мускулни проблеми (виж Какви нежелани ефекти може да има MEVACOR?), особено е важно да кажете на Вашия лекар ако взимате:

- cyclosporine
- danazol
- противогъбични средства (напр. Itraconazole и ketoconazole)
- фибрлати (като gemfibrozil, bezafibrate и fenofibrate)
- антибиотиците erithromycin , clarithromycin и telithromycin
- HIV протеазни инхибитори (като indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir)
- антидепресанта nefazodone
- amiodarone (лекарствен продукт за лечение на сърдечни аритмии)
- verapamil (лекарствен продукт за лечение на високо кръвно или ангила пекторис)
- високи дози (повече от 1 грам дневно) niacin или никотинова киселина

Също така е важно да кажете на Вашия лекар ако взимате антикоагуланти (лекарства, които предпазват от съсирване на кръвта, като warfarin, phenprocoumon или acenocoumarol).

Как трябва да взимам MEVACOR ?



Лекарят е предписал Вашата доза MEVACOR. Обичайната начална доза е 20mg дневно, назначена като еднократен прием вечер, по време на хранене. Вашият лекар може да определи доза до 80mg дневно, назначена като еднократен прием вечер, по време на хранене или разделена на два приема, сутрин и вечер по време на хранене.

За деца (между 10 и 17 годишна възраст), препоръчителната доза е 10/40mg дневно; максималната препоръчителна доза е 40mg дневно.

Той може да Ви предпише препарата и в по-ниски дози, особено в случай че приемате някои от лекарствата описани по-горе или страдате от някои бъбречни заболявания. Не прекратявайте лечението си с MEVACOR докато Вашият лекар не Ви каже. Ако спрете да приемате MEVACOR, холестеролът Ви отново ще се повиши.

Какво трябва да направя в случай на предозиране?

Незабавно се свържете с Вашия лекар.

Какво трябва да направя, ако пропусна да взема една доза?

Старайте се да приемате MEVACOR така, както Ви е предписано. Ако все пак обаче пропуснете да вземете една доза, не взимайте допълнителна доза. Просто продължете по обичайната си схема на лечение.

Какви нежелани ефекти може да има MEVACOR?

Всеки един лекарствен продукт може да има непредвидени или нежелани ефекти, т.нар. странични ефекти. По принцип MEVACOR има добра поносимост. Повечето от страничните му ефекти са леки и краткотрайни. Най-честите му странични ефекти са нарушения в храносмилането, замаяност, замъглено зрение, главоболие, и обрив. По-рядко се срещат мускулни болки, отмаяване или слабост, чернодробни оплаквания и свръхчувствителност (алергични реакции, които могат да включват различни симптоми като ставни болки, висока температура и задух).

Веднага се консултирайте с Вашият лекар ако почувствате мускулна болка, отмаяване или слабост. Това е необходимо, защото в редки случаи, мускулните проблеми могат да бъдат сериозни, включително мускулен разпад водещ до бъбречно увреждане.

Този риск от мускулен разпад е по-голям при пациенти взимащи високи дози MEVACOR. Този риск от мускулен разпад е по-висок при пациенти с нарушена бъбречна функция.

В редки случаи могат да се появят и други странични ефекти, както при всеки лекарствен продукт, които могат да се окажат с по-сериозни последици. Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за повече информация. И двамата разполагат с пълен списък на страничните ефекти на този препарат.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако се появят необичайни симптоми или ако вече известен симптом не отзува или се задълбочава.

Как мога да науча нещо повече за MEVACOR и за високия холестерол?

По-пълна информация можете да получите от Вашия лекар или фармацевт. И двамата разполагат с много по-подробни данни за MEVACOR и за високия холестерол.

Какъв срок на годност има моето лекарство?

Не употребявайте този препарат по-късно от датата, посочена с четири цифри след "Годен до:" върху опаковката. Първите две цифри означават месеци, а последните две цифри - годината.



Как трябва да съхранявам MEVACOR ?

Съхранявайте MEVACOR при температура под 30°C, на тъмно и в оригиналната му опаковка.

Съхранявайте MEVACOR и всички лекарства на място недостъпно за деца.

Кога за последен път е осъвременена тази брошура?

За последен път тази брошура е осъвременена юли 2005

