




NOBEL İLAÇ
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ds



Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като в нея се съдържа важна за Вас информация. Ако искате да научите повече за този продукт или част от информацията в листовката не Ви е ясна, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Ambrex® / Амбрекс®

Ambroxol

Сироп за деца

СЪСТАВ:

Всяка доза от 5 ml от сиропа **Ambrex®** сироп за деца съдържат 15 mg Ambroxol hydrochloride.

Помощни вещества: метилпарабен и пропилпарабен, 70% сорбитол, есенция малина и др.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Ambrex® сироп за деца може да намерите в бутилка от 100 ml, в кутията има оригинална лъжичка с вместимост 5 ml.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

NOBEL İLAC SANAYİİ ve TİCARET A.S.

Barbaros Bulvarı 76-78

34353 Besiktas, Istanbul, Turkey

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PLANTAFARMA İLAC SANAYİİ ve TİCARET A.S.

Sancaklar Koyu 81100 / Duzce, Turkey

ДЕЙСТВИЕ

Ambrex® втечнява бронхиалния секрет, засилва ефекта на ресничките на бронхиалната лигавица, което води до усилено отделяне на секрета.

ПОКАЗАНИЯ

Ambrex® сироп за деца е показан при пациенти с остри или хронични респираторни заболявания придружени със секреторни нарушения, като:

- Бронхит
- Бронхиална астма, със затруднено отделяне на секрет
- Втечняване на бронхиален секрет при възпалителни заболявания в областта на ринофаринкса



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Ambrex[®] сироп за деца е противопоказан при пациенти с анамнеза за алергични реакции спрямо bromhexine или неговия метаболит Ambroxol.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Ambrex[®] сироп за деца не трябва да се прилага при пациенти, на които е назначено лечение с кодеин или други противокашлични средства.

Преди да започнете лечението с **Ambrex[®]** сироп за деца информирайте Вашия лекар, ако страдате от:

- Бъбречна или чернодробна недостатъчност
- Вродена недостатъчност към фруктозата

Бременност и кърмене

Ambrex[®] сироп е предназначен за деца.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Моля, информирайте Вашия лекар, ако взимате или доскоро сте взимали други лекарствени продукти, дори и такива, отпускани без лекарско предписание. Особено важно е да информирате Вашия лекар, ако взимате антибиотици като амоксицилин, цефуроксим, еритромицин и доксациклин.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Няма данни. **Ambrex[®]** сироп е предназначен за деца.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Без лекарско предписание при деца и юноши над 2 години!

Дозата за деца от 2 до 5 години: 1/2 ч. лъжичка 3 пъти дневно (3 x 2.5 ml).

Дозата за деца от 5 до 12 години: 1 ч. лъжичка 2 - 3 пъти дневно (2 – 3 x 5 ml).

По лекарско предписание при деца под 2 години!

Дозата за деца под 2 години: 2 пъти по 1/2 ч. лъжичка (2 x 2,5 ml).

При малки деца под 1 години не се препоръчва даването на муколитик, поради невъзможност за отхрачване. Преценката трябва да бъде извършена от лекар.

Продължителност на лечението е от 5 – 7 дни.

ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай на предозирание, незабавно се свържете с Вашия лекар.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ



Обикновено **Ambrex®** сироп за деца се понася добре. По-рядко срещани нежелани реакции са: гадене, повръщане, диария, обрив, сърбеж, уморяемост и главоболие. Възможно е преходно увеличение на чернодробните ензими (ALT, AST).

ДАННИ ЗА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА:

Съдържа сорбитол.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ.

НАЧИН НА СЪХРАНИЕ

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Срок на годност след отваряне: 6 месеца

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не се изискват специални температурни условия за съхранение.

Регистрационен №:

Дата на последна редакция на листовката: май 2005 г.

