

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ  
ОБОБРЕНО!  
ГДА 31.01.06г.

MYLERAN™  
Film coated tablets

МИЛЕРАН™  
Филмирани таблетки  
*Busulfan*

Тази листовка се отнася само за MYLERAN. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Тя ви информира за най-важното относно MYLERAN. За повече информация или съвет се обърнете към лекуващия ви лекар.

### Наименование на лекарството.

Името на лекарството е MYLERAN (Милеран).

### Какво представлява MYLERAN

MYLERAN е под формата на филмирани таблетки. Всяка таблетка MYLERAN съдържа 2 mg от лекарственото вещество busulfan (бусулфан). Таблетките са бели на цвят, кръгли, с филмово покритие и надпис "GX EF3" от едната страна и "M" от другата. Всяка таблетка MYLERAN съдържа следните помощни вещества, необходими, за да се направи лекарствената форма: лактозен анхидрид, прежелатиново нишесте, магнезиев стеарат, хипромелоза, титанов диоксид и триацетин.

MYLERAN се предлага в бутилки от тъмно матово стъкло с капачка, защитена срещу отваряне от деца. Всяка опаковка съдържа 25 таблетки или 100 таблетки.

### Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му

MYLERAN се произвежда от Heumann PCS GmbH, Nurnberger Strasse 12, 90537 Feucht, Germany. Притежател на разрешението за употребата му е Glaxo Group Ltd., Greenford Road, Greenford, Middlesex UB6 0NN, UK, представяван в България от GlaxoSmithKline Export Ltd. с адрес: София 1408, ул. Димитър Манов, бл.10.

### Как действа и за какво се използва лекарството

MYLERAN принадлежи към група лекарства, наричани цитостатици.

Използва се за лечение на заболявания на кръвта.

### Какво трябва да имате предвид преди започване на приема

Преди да започнете приема, проверете дали употребата на MYLERAN е правилна във вашия случай и дали MYLERAN е лекарство подходящо за вас.

Ако отговорите с "да" на някои от следните въпроси, уведомете лекаря за това, преди да започнете да приемате лекарството:

- Имати ли сте някога прояви на алергия или повищена чувствителност към MYLERAN, бусулфан или някоя от другите съставки на лекарството?
- Бременна ли сте? Планирате ли скорошна бременност, респективно скорошно башинство?

MYLERAN може да увреди вашата сперма, яйцеклетки или бебето. Необходимо е да използвате противозачатъчни средства, за да избегнете забременяване, докато вие или партньорът ви приемате лекарството. Обърнете се към лекаря за съвет.

- Кърмите ли?
- Имунизирани ли сте или планирате ли да се имунизирате с жива ваксина?
- Подложени ли сте в момента/били ли сте подложени неотдавна на лъчтерапия?



- Имате ли заболявания на бъбреците или черния дроб?
- Ще приемате ли phenitoin, itraconazole, metronidazole или други цитостатични лекарства едновременно с MYLERAN?
- Предстои ли ви операция?

### **Как да приемате лекарството**

Приемайте вашето лекарство както лекуващият лекар ви е препоръчал. Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението. Важно е лекарството да бъде приемано в точно определеното време. Ако не сте сигурни как и в каква доза да приемате лекарството, попитайте лекаря.

Таблетките трябва да се погълнат цели, с малко вода. Не трябва да се чупят, дъвчат или стриват на прах.

Дозата на MYLERAN е индивидуална. Само вашият лекар може да я променя във времето. По време на лечението с MYLERAN вашият лекар ще изследва кръвните ви показатели, за да установи дали е необходима промяна в дозата.

В случай че ви предстои операция, предупредете хирурга или анестезиолога, че приемате MYLERAN.

### **Какво да направите в случай, че приемете повече от предписаното**

Случайното приемане на твърде голяма доза от лекарството може да ви създаде сериозни проблеми.

Ако сте приели прекалено висока доза MYLERAN или някой друг от обкръжението ви (особено деца) е погълнал лекарството погрешка, потърсете незабавно лекарска помощ като уведомите незабавно лекуващия лекар или се обадите на Бърза помощ.

### **Какво да направите в случай, че пропуснете прием**

Ако забравите и пропуснете да приемете поредната доза се обърнете за съвет към лекаря. Не приемайте двойна доза.

### **Причинява ли MYLERAN нежелани реакции**

MYLERAN, както всеки друг цитостатик, може да причини нежелани лекарствени реакции.

При жените може да има смущения или спиране в менструалния цикъл.

При млади момичета пубертетът може да се забави или да спре.

При мъжете може да спре или да се наруши продукцията на сперматозоиди (сперматогенезата).

Възможно е да настъпи стерилитет. В редки случаи, обаче, възпроизводителната способност може да се възвърне, дори и ако продължавате да приемате MYLERAN. Затова е необходимо да използвате противозачатъчни средства, за да избегнете забременяване. (виж "Какво трябва да имате предвид преди започване на приема").

Някои хора имат алергии към лекарства. Ако някои от следните симптоми се появят скоро след приемане на MYLERAN, СПРЕТЕ приема на лекарството и незабавно потърсете лекарска помощ:

- внезапно хриптене, болка и стягане в гърдите, затруднение в дишането;
- оток на клепачите, лицето, устните, устата и езика;
- обширен кожен обрив или петна по цялото тяло.

Незабавно уведомете вашия лекар, ако по време на лечение с MYLERAN се появят някои от следните реакции:



- не се чувствате добре, повръщате, имате диария и трудно зарастващи ранички в устата;
- белези на жълтеница (пожълтяване на кожата и/или бялата част на очите);
- загуба на тегло, слабост или лесна уморяемост;
- кожни обриви, сърбеж, тъмни петна, сухота и потъмняване на кожата, оредяване на косата;
- възможно е влошаване на кръвните ви показатели. Вашият лекар ще изисква редовно да изследва вашата кръв. Уведомете лекаря, ако забележите прояви на възпаление (напр. болка при уриниране - цистит) или треска;
- кръвонасядания, внезапно кървене или кръв в урината;
- припадъци или конвулсии;
- боледувате от таласемия (вид заболяване на кръвта) и имате задух;
- постоянна кашлица и затруднено дишане;
- мускулна слабост;
- подуване в гръдената област;
- влошаване на зрението;
- при мъже-болезненост и уголемяване на гърдите (млечните жлези).

Информирайте лекаря, ако забележите други нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка или ако има нещо, което ви тревожи, смущава, или не разбирате.

#### **Как се съхранява лекарството**

Да се съхранява при стайна температура, под 25 °C.

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Не приемайте лекарството след изтичане на срока за годност, обозначен върху опаковката.

Препоръчително е след като преустановите приема на лекарството да върнете неизползваните таблетки на лекаря или фармацевта, за да бъдат съхранявани или унищожени безопасно.

**ЗАПОМНЕТЕ!** Това лекарство е единствено за вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите или подобни на вашите.

Тази листовка не ви дава пълна информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни в нещо, попитайте лекуващия ви лекар. Може да ви се наложи да прочетете тази листовка отново, затова не я изхвърляйте, докато не употребите или изхвърлите лекарството в опаковката.

MYLERAN е запазена марка на GlaxoSmithKline group of companies

Дата на последна редакция: май 2005 г.

