

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 14.01.06

Магне В6 Премиум 100 mg/10mg филмиранi таблетки

MAGNE B6 Premium 100 mg/ 10mg film-coated tablets

Magnesium, Piridoxine

Моля прочетете тази листовка внимателно преди да започнете употребата на този лекарствен продукт. Тя съдържа важна информация за Вашето лечение.

- Пазете тази листовка, може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако Вие имате някакви въпроси обърнете се към своя лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано на Вас от лекуващия Ви лекар и не трябва да го преотстъпвате на друг, даже и той да има същите симтоми като Вашите.

Състав:

Лекарствените вещества в една таблетка са:

Magnesium	100.00 mg
Под формата на anhydrous magnesium citrate	618.43 mg
Pyrithoxine hydrochloride	10.00 mg

Помощни вещества:

Ядро: безводна лактоза, макрогол 6000, магнезиев стеарат.

Филмово покритие: хипромелоза, макрогол 6000, титаниев диоксид (Е 171), талк.

Фармако-терапевтична група:

МАГНЕ-В6 принадлежи към групата на минерални добавки.

Притежател на разрешението за употреба:

SANOFI –SYNTHELABO OTC

9, rue du President Allende

94258 Gentilly Cedex

FRANCE

Производител

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, RUE DE LA Vierge

AMBARES ET LAGRAVE

33565 CARBON BLANC CEDEX

или

Chinoim Pharmaceutical and

Chemical Works Co. Ltd,

Habor Park Campona u.1 1222 Budapest Hungary

1.Какво е и кога се използва МАГНЕ-В6 Премиум 100 mg/ 10 mg ?

МАГНЕ-В6 Премиум 100 mg/ 10 mg се предлага под формата на филмиранi таблетки в опаковки от 30, 60, 90 и 120 таблетки.

Минерална добавка

A: (X раносмилателна система и метаболизъм)

Това лекарство съдържа магнезий.



Установен магнезиев дефицит- изолиран или комбиниран, който може да бъде изразен с някои от следните симптоми:

- нервност, раздразнителност, умерена тревожност, преходна отпадналост, леки разстройства на съня,
- признания на напрегнатост, като стомашно-чревни спазми или сърцеви сърце),
- мускулни крампи, чувство за лазене на мравки.

Прилагането на магнезий може да помогне за лечението на подобни симптоми.

2. Преди да започнете да вземате Магне В6 Премиум

Кога не трябва да се използва МАГНЕ-В₆?

МАГНЕ-В₆ не се използва при следните случаи:

- известна алергия към някоя от съставките (виж състава).
- остра бъбречна недостатъчност

АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ ВАЖНО Е ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

Специални мерки при употреба

Предупреждения

Поради наличието на лактоза, това лекарство е противопоказано в случаи на вродена галактоземия, синдром на малабсорбция на глюкоза или галактоза, или дефицит на лактаза.

Предпазни мерки при употреба

Тази доза е неподходяща за употреба от деца с тегло под 20 kg (около 6 годишна възраст).

В случаи на умерена бъбречна недостатъчност, трябва да се вземат предпазни мерки за предотвратяване риска от хипермагнезиемия.

Ако след едномесечно лечение не се наблюдава подобреие на симптоматиката, обърнете се към Вашия лекар за съвет.

Лечението се прекратява веднага след нормализиране нивото на магнезия.

АКО НЕ СТЕ СИ ГУРНИ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

Важна информация преди употребата на МАГНЕ-В₆ ?

Преди употреба трябва да информирате лекуващия Ви лекар, ако имате или сте имали следните случаи на:

- съпътстващ калциев дефицит
- проблеми с бъбреците

Таблетките са предназначени за възрастни и деца над 6 години.

Възможна ли е едновременна употреба на МАГНЕ-В₆ и други лекарствени продукти ?

Трябва да информирате Вашия лекар за всяко вземано от Вас лекарство, включително и такива без лекарско предписание и такива, съдържащи фосфатни или калциеви соли.

Може ли да се използва МАГНЕ-В₆ по време на бременност и кърмене?



При необходимост, във всеки етап на бременността може да се преценява съотношението риск/полза за прилагане на магнезий.

Тъй като магнезият преминава в кърмата, по време на кърмене употребата на магнезий трябва да се избягва.

КАТО ПРАВИЛО ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪВЕТВАТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНете ДА ВЗЕМАТЕ КАКВОТО И ДА Е ЛЕКАРСТВО, КОГАТО СТЕ БРЕМЕННА ИЛИ КЪРМИТЕ.

Шофиране и работа с машини

Няма специални препоръки относно шофирането и работата с машини.

Помощни вещества, които се съдържат в лекарството и трябва да се вземат предвид трябва при употребата му.

Лактоза

3. Дозировка и начин на употреба.

ТОВА ЛЕКАРСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА САМО ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 6 ГОДИНИ.

Възрастни: от 3 до 4 таблетки дневно, разделени на 2 или 3 приема по време на хранене.

Деца над 6 години (приблизително 20 kg): 2 до 4 таблетки, разделени на 2 или 3 приема по време на хранене.

Таблетките се приемат през устата с чаша вода.

Дневната доза се разпределя на няколко малки приема преди или по време на хранене.

Лечението се прекратява веднага след нормализиране нивата на магнезия в кръвта.

При пропускане на дадена доза

Ако пропуснете вземането на дадена доза, продължете по предписаната схема без да вземате двойна доза.

Предозиране

Предозирането с магнезий при перорален прием по принцип не предизвиква токсични реакции при нормална бъбречна функция. Магнезиево отравяне обаче, може да възникне при бъбречна недостатъчност.

Нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани лекарствени реакции, като:

- диария и коремни болки,
- кожни реакции
- алергични реакции

В случай на появя на никакви нежелани лекарствени реакции информирайте лекуващия Ви лекар.

Начин на съхранение

Няма специални изисквания за съхранение

Да не се използва след изтичане срока на годност, изписан върху опаковката.



Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Дата на последната редакция: май 2005

