

БЕБОГЕЛ

BEVOGEL

обезболяващ гел за венци при растеж на бебешки зъби

СЪСТАВ

Активни вещества в 1 г гел: Lidocaine hydrochloride 3,3 mg,

Cetylpyridinium chloride 1 mg.

Помощни вещества: метил парахидроксибензоат, хидроксиетилцелулоза, глицерол, сорбитол, аромат „Ягода“, пречистена вода.

ДЕЙСТВИЕ

Препарат с местнообезболяващ и противомикробен ефект, предназначен за педиатричната практика при растеж на млечни зъби. При втриване във венците след 2-3 минути се постига максимален обезболяващ ефект, който продължава около 30 минути.

ПОКАЗАНИЯ

Болки и възпаление на венците при растеж на млечните зъби при кърмачета и малки деца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Алергия към лидокаин, цетилпиридин и метилпарахидроксибензоат.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Понася се добре. Много рядко може да се наблюдават алергични реакции.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Не са известни.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Препаратът се използва при деца над 3-месечна възраст.

Препоръчаната доза не трябва да се превишава. Не трябва да се използва при деца, алергични към някоя от съставките на препарата или близки по състав продукти. При поява на нежелани лекарствени реакции или при предозиране трябва незабавно да се прекрати употребата на препарата и да се направи консултация с лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При перорално поглъщане на препаратa може да се наблюдава гадене и повръщане.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Ако Вашият педиатър не е предписал друг начин на употреба, тогава прилагайте препаратa по следния начин: малко количество (около 7,5 мм) се изстиска от тубичката на върха на пръста и се втрива внимателно върху болезненото място на венците. Ако е необходимо процедурата може да се повтаря през интервал от 20 минути, но не повече от 6 пъти дневно.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Гел, по 15 г в туба.

СЪХРАНЕНИЕ

На защитено от светлина място, при температура 15-25°C.

СРОК НА ГОДНОСТ

2 години

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

НИХФИ АД

бул. „Климент Охридски“ N 3

Последна редакция на листовката: януари 1999г.