



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

NUSTATIN ACTAVIS НИСТАТИН АКТАВИС

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!
- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Нистатин Актавис и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Нистатин Актавис
3. Как се прилага Нистатин Актавис
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Nystatin Actavis крем

Лекарствено вещество в 1 g крем: Nystatin 100 000 IU

Помощни вещества: натриев хексаметафосфат, глицерол, цетилов алкохол, стеаринова киселина, метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, глицерил моностеарат самоемулгиращ, полисорбат 60, сорбитан стеарат, бял вазелин, пречистена вода

Нистатин Актавис крем 15 g в алуминиеви туби

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

Бул."Княгиня Мария Луиза"№2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител

"Балканфарма-Разград" АД

бул."Априлско въстание" №68

Разград-7200

Тел. 084615318



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НИСТАТИН АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Нистатин Актавис е противогъбичен продукт за прилагане върху кожата.

Нистатин Актавис се прилага за локално лечение на микоотични инфекции на кожата и полулигавиците, причинени от гъбички, наречени кандиди като:

- Ангуларен хейлит (сцепване на устните ъгли);
- Ерозии в междупръстните гънки на ръцете;
- Кандида периониксис (гъбична инфекция около ноктите);
- Кандидозни баланити и вулвити (гъбични инфекции на външните полови органи при мъже и жени);
- Дерматит от пелени при кърмачета;
- Гъбични инфекции при продължително лечение с антибиотици или при имуносупресия.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С НИСТАТИН АКТАВИС

Нистатин Актавис не се прилага при свръхчувствителност към лекарственото и някое от помощните вещества.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Наличието на парахидроксибензоати може да е причина за развитие на контактен дерматит и уртикария.

При прояви на свръхчувствителност – засилване на сърбежа, зачервяването и отока, както и видимо влошаване на състоянието е необходимо прекратяване на лечението и преразглеждане на терапевтичните схеми.

Лекарственият продукт е предназначен само за външно приложение.

Не се поставят оклузивни превръзки.

При нанасяне да не се допуска попадане в очите директно или от замърсени с препаратата ръце.

Приложение на Нистатин Актавис и прием на храни и напитки

Продуктът е за употреба върху кожата.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Тъй като няма системна резорбция Нистатин Актавис може да се прилага по време на бременността и кърменето.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт



Тъй като няма системна резорбция Нистатин Актавис може да се прилага по време на бременността и кърменето.

Шофиране и работа с машини

Нистатин Актавис не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Нистатин Актавис

Продуктът съдържа метил и пропил парахидроксибензоат. Те причиняват контактен дерматит (забавен тип алергична реакция), по-рядко реакции от бърз тип като уртикария и бронхоспазъм.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Няма данни за нежелани лекарствени реакции от продукта.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА НИСТАТИН АКТАВИС

Винаги приемайте Нистатин Актавис според инструкциите на лекуващия лекар!

Нистатин Актавис крем се прилага върху кожата два или четири пъти дневно. На намазване подлежат участъците с възпалена кожа, но също така и околната зона от 5-10 мм, която изглежда видимо здрава. Лечението трябва да продължи най-малко 2-3 дни след изчезване на клиничните симптоми.

Кремът като лекарствена форма е по-лесен за нанасяне при третиране на окосмени участъци и гънки, по лицето, както и островъзпалителни промени с тенденция към ексудация и подмокряне.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!

Няма данни за предозиране с и прояви на токсичност.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Нистатин Актавис може за предизвика нежелани лекарствени реакции

Нистатин Актавис маз се понася много добре. В медицинската литература са описани единични случаи на тежки кожни реакции (екзантемоидна пустулоза, еритема мултиформе след сенсibiliзация с перорален нистатин). Съществува публикация, в която се обсъжда, че алергичните реакции към нистатин са редки, но при апликация върху възпалена кожа е вероятна системна резорбция и възможна сенсibiliзация.

Няма данни за нежелани лекарствени реакции от продукта.



Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се замразява!

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност: 2 (две) години

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – май 2006 г.

